

**20. — *Ranunculus gramineus* L. Renoncule graminée.** — Souche vivace, renflée, chevelue, à fibres épaisses; tige de 10-40 cm., droite, simple ou peu rameuse, glabre; feuilles toutes lancéolées-linéaires, très entières, nervées; fleurs jaunes, grandes, peu nombreuses, longuement pédonculées; sépales glabres; pétales ovales-triangulaires; réceptacle glabre; carpelles en tête ovoïde, glabres, renflés, non carénés, ridés, à bec court, un peu arqué.

Pelouses sèches du Midi, de l'Ouest et du Centre, jusqu'à l'Orne et aux environs de Paris. — Suisse méridionale et Italie; Péninsule hispanique; Maroc et Algérie. = Mai-juin.



Ranunculus gramineus.

**21. — *R. Lingua* L. Grande Douve.** — Souche vivace, stolonifère; tige d'environ 1 mètre, dressée, creuse, rameuse, glabre ou pubescente au sommet; feuilles très longues, lancéolées-acuminées, entières ou dentelées, demi-embrassantes, les submergées ovales en cœur; pédoncules opposés aux feuilles, non sillonnés, à poils appliqués; fleurs jaunes, grandes, longuement pédonculées; sépales poilus; réceptacle glabre; carpelles en tête globuleuse, comprimés, carénés, à bec large, court, persistant.

Maraîches, étangs, fossés aquatiques, dans presque toute la France; rare dans le Midi; nul en Corse. — Europe surtout centrale; Asie centrale et Inde. = Juin-août.



Ranunculus Lingua.

**22. — *R. Flammula* L. Petite Douve.** — Souche vivace, courte, sans stolons; tige de 10-40 cm., ascendante ou couchée-radicante, creuse, rameuse, glabre; feuilles glabres, entières ou dentelées, les inférieures ovales ou oblongues, longuement pétiolées, les supérieures subsessiles, lancéolées-linéaires, non acuminées; pédoncules opposés aux feuilles, légèrement sillonnés; fleurs assez petites, jaunes, longuement pédonculées; sépales pubescents; réceptacle glabre; carpelles en tête globuleuse, renflés, à peine bordés, lisses, à bec très court, étroit, caduc.

Prés marécageux, fossés, dans presque toute la France; rare dans le Midi et en Corse. — Europe surtout centrale et septentrionale; Asie et Amérique boréales. = Mai-septembre. — Espèce vénéneuse; produit, dit-on, la pourriture du foie des moutons.



Ranunculus Flammula.

**23. — *R. ophioglossifolius* Vill. Renoncule à feuilles d'ophioglosse.** — Racine annuelle, fibreuse; tige de 10-40 cm., dressée, creuse, rameuse, radicante inférieurement; feuilles glabres, entières ou dentées, les inférieures longuement pétiolées, ovales en cœur, les moyennes ovales-oblongues, les supérieures lancéolées, subsessiles; pédoncules opposés aux feuilles, un peu striés; fleurs petites, d'un jaune pâle, longuement pédonculées; sépales glabres; pétales dépassant un peu le calice; réceptacle glabre; carpelles comprimés, à peine bordés, finement tuberculeux, à bec très court.

Mares et fossés, dans le Midi, l'Ouest et le Centre; Corse. — Europe méridionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Mai-juillet.



Ranunculus ophioglossifolius.