

**44. — *Ranunculus repens* L. Renoncule rampante** (Pied-de-poule). — Souche vivace, courte, non renflée; tiges de 20-50 cm., plus ou moins velues, pluriflores, redressées, munies à la base de rejets rampants et stoloniformes; feuilles velues ou glabrescentes, ovales dans leur pourtour, pennatiséquées, à 3 segments larges, trilobés, incisés-dentés, le moyen plus longuement pétiolulé; pédoncules sillonnés; sépales étalés, velus; réceptacle velu; carpelles glabres, comprimés, bordés, à bec grêle un peu courbé, égalant environ le tiers de leur longueur.

Près, champs, fossés, bois, lieux frais et humides, dans toute la France et en Corse. — Europe; Afrique septentrionale; Asie centrale et septentrionale; Amérique du Nord. = Mai-septembre. — Nuisible aux cultures.



*Ranunculus repens.*

**45. — *R. bulbosus* L. R. bulbeuse** (Rave-de-Saint-Antoine). — Souche vivace, courte, renflée en bulbe arrondi, à racines fibreuses; tige de 20-60 cm., dressée ou ascendante, velue, ainsi que les feuilles; feuilles ovales dans leur pourtour, pennatiséquées, à 3 segments trilobés, incisés-dentés, le moyen plus longuement pétiolulé; pédoncules sillonnés; sépales réfléchis, velus; réceptacle velu; carpelles glabres, comprimés, fortement bordés, à bec court, large, un peu arqué au sommet.

Varie à souche non bulbiforme à fibres épaisses et longuement atténuées, à feuilles plus profondément divisées (*R. ALBA* Willk.; *R. NEAPOLITANUS* G. G. non Ten.).

Près, pelouses, talus, champs, dans toute la France et en Corse. — Europe surtout centrale et septentrionale; Afrique septentrionale. = Avril-juillet. — Vénéneuse; nuisible aux prairies.



*Ranunculus bulbosus.*

## Genre 2. — *FICARIA* Dill. — *Ficaire*.

(Du latin *ficus*, figue : allusion à la forme des fibres radicales.)

**46. — *Ficaria ranunculoides* Roth. (*RANUNCULUS FICARIA* L.). Ficaire, Bouton d'or.** — Souche vivace, à fibres fasciculées, renflées en massue; tige de 10-30 cm., étalée, rameuse, glabre; feuilles luisantes, ovales en cœur, obtuses, entières ou sinuées anguleuses, à long pétiole engainant; pédoncules sillonnés, à la fin recourbés; fleurs d'un jaune luisant, solitaires; 3 sépales; 6-12 pétales, à onglet muni d'une écaille nectarifère; stigmate sessile; carpelles en tête globuleuse, pubescents, renflés, sans bec.

Varie, dans le Midi, à fleurs grandes et à feuilles larges, suborbiculaires (*F. GRANDIFLORA* Rob.; *F. CALTHIFOLIA* G. G.).

Haies, champs, bois humides, dans toute la France et en Corse. — Europe; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Mars-mai.



*Ficaria ranunculoides.*