



Anemone coronaria.



Anemone vernalis.



Anemone Halleri.



Anemone Pulsatilla.

- ✕ 74. — **Anemone coronaria** L. *Anémone couronnée*. — Souche tubéreuse, brune; hampe 20-40 cm., un peu poilue dans le haut, uniflore; feuilles tripennées, à segments profondément découpés en lanières divergentes; folioles de l'involucre sessiles, profondément divisées; fleurs bleues, violettes, rouges ou blanches, grandes, solitaires; sépales 5-8, larges, ovales ou arrondis, aigus ou obtus; carpelles laineux, à bec court et glabre. *Espèce très polymorphe*

Champs et vignes, dans la Provence et le Languedoc; Charente-Inférieure; Corse. — Région méditerranéenne de l'Europe; Asie occidentale. = Février-avril. — Plante polymorphe, souvent cultivée dans les jardins.

75. — **A. vernalis** L. *A. du printemps*. — Souche oblique, épaisse, noirâtre; hampe de 4-12 cm., velue-soyeuse; feuilles pubescentes, pennatiséquées, à folioles larges, ovales, bi-trifides; folioles de l'involucre sessiles, découpées jusqu'à la base en lanières linéaires; fleurs blanchâtres en dedans, violacées en dehors, assez grandes, dressées, solitaires; sépales 6, elliptiques, velus-soyeux en dehors, dressés; carpelles oblongs, velus, à longue arête plumeuse.

Pâturages des hautes montagnes: Alpes; Pyrénées; Plomb du Cantal; Mezenc; Lorraine et Alsace. — Europe surtout centrale et orientale; Sibérie. = Avril-juillet.

76. — **A. Halleri** All. *A. de Haller*. — Souche oblique, épaisse, noirâtre; hampe de 10-20 cm., velue-soyeuse; feuilles très velues, bipennatiséquées, à lanières linéaires-lancéolées; folioles de l'involucre sessiles, découpées jusqu'à la base en lanières linéaires-lancéolées; fleurs lilas des deux côtés, grandes, dressées, solitaires; sépales 6, elliptiques, velus-soyeux en dehors, dressés; carpelles oblongs, velus, à longue arête plumeuse.

Pâturages élevés, dans les Alpes de la Savoie, du Dauphiné et de la Provence. — Alpes suisses et italiennes; Autriche-Hongrie; Pologne. = Juin-juillet.

- ✕ 77. — **A. Pulsatilla** L. *A. Pulsatille, Coquelourde, Fleur de Pâques*. — Souche oblique, épaisse, noirâtre; hampe de 10-30 cm., velue-soyeuse; feuilles poilues, bi-tripennatiséquées, à segments profondément divisés en lanières linéaires; folioles de l'involucre sessiles, divisées jusqu'à la base en lanières linéaires; fleurs rougeâtres ou violettes, grandes, solitaires, dressées ou à la fin penchées; sépales 6, elliptiques, velus-soyeux en dehors, plus ou moins courbés en dehors dans la moitié supérieure; carpelles oblongs, velus, à longue arête plumeuse.

Pâturages et coteaux, dans presque toute la France. — Presque toute l'Europe; Sibérie. = Mars-juin. — Plante très âcre, vésicante, efficace contre l'amaurose et la paralysie.