

**Helleborus viridis.****Helleborus lividus.****Helleborus foetidus.****Eranthis hiemalis.**

✓ **87. — Helleborus viridis L.** *Hellébore vert, Herbe à sétos.* — Plante glabre ou pubescente, inodore; tige de 20-40 cm., annuelle, nue jusqu'aux rameaux; feuilles radicales 1-2, détruites pendant l'hiver, pédalées, à 9-11 segments lancéolés ou oblongs, finement ou profondément dentés; les florales sessiles, digitées, vertes; fleurs verdâtres ou rosées, peu nombreuses; sépales étalés, à peine concaves, plus longs que les étamines; pétales dépassant la moitié des étamines; follicules presque aussi larges que longs, à bec égalant la moitié de leur longueur.

Haies et bois, çà et là dans presque toute la France. — Europe occidentale et centrale. = Mars-avril. — Vénéneux, mais très usité dans la médecine vétérinaire.

^ **88. — H. lividus Ait.** *H. livide.* — Plante glabre; tige robuste, feuillée, rameuse au sommet, à rameaux munis de bractées lancéolées, dentées; feuilles coriaces, triséquées, à 3 segments ovales ou lancéolés, bordés de dents spinescentes, les 2 latéraux dilatés extérieurement; fleurs blanchâtres ou rosées, assez nombreuses; sépales étalés, à peine concaves; pétales de moitié moins longs que les étamines; follicules plus longs que larges, à bec dressé, égalant leur longueur,

Région montagneuse de la Corse. — Sardaigne; Baléares. = Novembre-avril.

^ **89. — H. foetidus L.** *H. fétide, Pied de griffon.* — Plante glabre, fétide; tige de 20-80 cm., robuste, persistante, nue à la base, très feuillée sous les rameaux munis de bractées ovales et d'un vert pâle; feuilles toutes caulinaires, coriaces, pédalées, à 7-11 segments lancéolés, dentés; fleurs verdâtres ou rougeâtres, nombreuses, penchées; sépales dressés, connivents, concaves, égalant les étamines; pétales de moitié moins longs que les étamines; follicules plus longs que larges, à bec égalant la moitié de leur longueur.

Coteaux et bois, dans presque toute la France. — Europe occidentale et centrale, jusqu'à la Styrie. = Janvier-mai. — Vénéneux, drastique, souvent employé en médecine vétérinaire.

GENRE 12. — ERANTHIS Salisb. — *Eranthis*.

(Du grec *er*, printemps, *anthos*, fleur : les fleurs sont très précoces.)

5 espèces habitant les montagnes de l'Europe et de l'Asie.

90. — Eranthis hiemalis Salisb. *Hellébore d'hiver.* — Souche vivace, courte, tuberculeuse; tige de 10-20 cm., nue, glabre; feuilles glabres, paraissant après les fleurs, 1-2 radicales, orbiculaires-pennatiséquées; involucre semblable aux feuilles, dépassant la fleur et le fruit; fleurs jaunes, solitaires et sessiles dans l'involucre; sépales 5-8, pétaloïdes, caducs; pétales 5-8, très petits, tubuleux, à 2 lèvres; follicules 5-8, libres, sur 1 rang, pédicellés, divergents, ridés en travers, à bec égalant la moitié de leur longueur.

Lieux humides boisés, dans les Vosges, le Jura, les Alpes du Dauphiné et de la Provence; naturalisé en Normandie. — Europe centrale, de la Suisse à la Serbie. = Février, mars.