

93. — *Nigella damascena* L. *Nigelle de Damas*, *Barbe de Capucin*, *Patte d'araignée*. — Tige de 20-40 cm., dressée, anguleuse, simple ou à rameaux dressés; feuilles multifides, à lanières aiguës; involucre semblable aux feuilles, entourant la fleur; sépales ovales-lancéolés, à onglet plus court que le limbe; anthères mutiques; *follicules soudés jusqu'au sommet et formant une capsule globuleuse, ballonnée, très lisse*; graines ridées en travers.

Champs et coteaux, dans tout le Midi, jusqu'à la Drôme, l'Aveyron et la Vendée. — Région méditerranéenne de l'Europe jusqu'à la Tauride; Afrique septentrionale. = Juin-juillet. — Cultivé dans les parterres.



*Nigella damascena.*

94. — *N. arvensis* L. *Nigelle des champs*, *N. bâtarde*. — Tige de 10-30 cm., dressée ou étalée, striée, à rameaux longs, divariqués; feuilles multifides, à lanières aiguës; pas d'involucre autour de la fleur; sépales ovales en cœur, contractés en onglet égalant presque le limbe; anthères apiculées; *follicules soudés jusqu'au delà du milieu, à 3 nervures dorsales*; graines finement granuleuses.

Moissons, dans une grande partie de la France; rare dans l'Ouest et le Centre. — Europe centrale et méridionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Juin-juillet.



*Nigella arvensis.*

95. — *N. gallica* Jord. (*N. hispanica* G. G., non L.). *N. de France*. — Tige de 20-30 cm., dressée, cannelée, rude, à rameaux courts et dressés; feuilles bipennatifides, à lobes oblongs-linéaires; involucre nul; sépales largement ovales, contractés en onglet égalant la moitié du limbe; anthères apiculées; *follicules soudés jusqu'au sommet en une capsule un peu rétrécie à la base et un peu rude au sommet, à 3 nervures dorsales*; graines lisses, marbrées.

Moissons, dans le Midi et le Sud-Ouest, depuis les Bouches-du-Rhône jusqu'aux Deux-Sèvres. — Espagne septentrionale et centrale (form. *N. hispanica* L.). = Juillet-août.



*Nigella gallica.*

Genre 16. — DELPHINIUM L. — *Dauphinelle*, *Pied d'alouette*.

(Du grec *delphis*, dauphin : allusion à l'éperon du sépale supérieur.)

Calice irrégulier, à 5 sépales pétaloïdes, caducs, inégaux, le supérieur prolongé en éperon; pétales 4, libres ou soudés, les 2 supérieurs prolongés en appendices inclus dans l'éperon du calice; follicules 1-3, libres, sessiles, à bec court.

Fleurs bleues, roses ou blanches, en grappe bractéolée; feuilles multifides ou palmatiséquées; tige dressée, feuillée, ordinairement pubescente.

Environ 70 espèces répandues dans l'Europe, l'Asie, l'Abyssinie, l'Amérique du Nord.