



Aconitum Anthora.



Aconitum lycoctonum.



Aconitum Napellus.



Aconitum paniculatum.

104. — **Aconitum Anthora** L. *Aconit vénéneux*. — Racine à tubercules renflés en navet; tige de 20-30 cm., pubescente, simple ou peu rameuse; feuilles profondément palmatipartites, à segments linéaires, décurrenants; fleurs jaunes, en grappe courte, ovale, à pédoncules dressés; sépales pubescents, longtemps persistants; casque convexe-hémisphérique, presque aussi large que long, resserré au milieu; follicules 5, velus, à graines ridées sur toutes les faces.

Rochers et pâturages des hautes montagnes : Jura; Alpes; Corbières et Pyrénées. — Europe centrale et orientale; Asie occidentale. = Juillet-septembre.

105. — **A. lycoctonum** L. *A. tue-loup*. — Racine épaisse, charnue, fibreuse; tige atteignant 1 mètre, pubescente, à rameaux étalés; feuilles profondément palmatipartites, à 5-7 segments larges, en coin, incisés-lobés; fleurs d'un jaune pâle, en grappes ovales ou allongées, à pédoncules étalés; sépales pubescents, promptement caducs; casque cylindracé-conique, bien plus haut que large, étranglé près du sommet; follicules 3, glabres ou glabrescents, à graines ridées sur toutes les faces.

Bois et prés humides des montagnes : Vosges; Jura; Alpes; Plateau central; Cévennes; Corbières; Pyrénées. — Presque toute l'Europe; Asie occidentale; Inde; Maroc. = Juin-août. — Plante polymorphe, vénéneuse.

106. — **A. Napellus** L. *A. Napel, Casque de Jupiter, Char de Vénus*. — Racine à tubercules renflés en navet; tige atteignant 1 ou 2 mètres, très feuillée, simple ou rameuse et pubescente dans le haut; feuilles profondément palmatiséquées, à divisions linéaires ou lancéolées; fleurs d'un bleu foncé, parfois violacées ou blanches, en grappe allongée ou en panicule, à pédoncules dressés ou un peu étalés; sépales pubescents; casque convexe-hémisphérique, à bec horizontal; follicules 3, glabres à la maturité et appliqués contre l'axe; graines ridées sur 1 seule face.

Bois et prés humides dans une grande partie de la France; nul dans l'Ouest et le Midi. — Europe; Asie. = Juillet-septembre. — Polymorphe, vénéneux, employé contre la goutte et les rhumatismes.

107. — **A. paniculatum** Lamk. *A. paniculé*. — Racine à tubercules renflés en navet; tige d'environ 1 mètre, très feuillée, pubescente au sommet, à rameaux étalés; feuilles palmatiséquées, à segments rhomboïdaux, bi-tripartits ou incisés-lobés; fleurs d'un bleu violacé ou panachées de blanc, en grappes courtes formant une panicule lâche, à rameaux et pédoncules étalés-divariqués; sépales glabres ou pubescents; casque comprimé en croissant, à bec descendant; follicules 3-4, glabres, écartés de l'axe; graines ridées-ondulées.

Bois humides des hautes montagnes : Jura méridional; Alpes de la Savoie et du Dauphiné. — Europe centrale jusqu'à la Roumanie. = Juillet-août.