




Aquilegia alpina.



Aquilegia Kitaibelii.



Aquilegia Reuteri



Aquilegia vulgaris.

110. — *Aquilegia alpina* L. *Ancolie des Alpes*. — Tige de 30-50 cm., glabre ou poilue, souvent visqueuse au sommet, à 1-5 fleurs; feuilles assez petites, glabres, biternées ou ternées, à folioles incisées-crênelées; fleur d'un bleu vif, très grandes; pétales à lame tronquée; éperon gros, un peu arqué au sommet, égalant ou dépassant peu la longueur de la lame; étamines plus courtes que la lame; filets stériles aigus; follicules grands, longs de 20-25 mill.

Pâturages et bois de la région alpine, dans les Alpes de la Savoie, du Dauphiné et de la Provence; mont Ventoux. — Suisse et Italie. = Juillet-août.

111. — *A. Kitaibelii* Schott. *A. de Kitaibel*. — Plante toute pubescente-visqueuse; tige de 20-40 cm., peu feuillée, à 2-5 fleurs; feuilles radicales assez brièvement pétiolées, biternées, à folioles petites, larges de 2 cm. environ, incisées très profondément, les caulinares sessiles, à lobes étroits ou entières; fleurs d'un bleu pâle, grandes; pétales à lame tronquée; éperon gros, recourbé en crochet, égalant ou dépassant la longueur de la lame; étamines plus courtes que la lame; filets stériles aigus; follicules assez petits.

Rochers calcaires des causses des Cévennes: Aveyron, Lozère, Gard, Hérault; Aude et Pyrénées-Orientales. — Croatie; Dalmatie; Herzégovine. = Juin-juillet.

112. — *A. Reuteri* Boiss. *A. de Reuter*. — Tige de 30-50 cm., simple ou peu rameuse, feuillée, à 1-5 fleurs; feuilles radicales biternées, à folioles profondément incisées-lobées, les supérieures à 3-7 lobes linéaires ou entières; fleurs d'un bleu vif, en panicule étroite, à pédoncules courts, peu écartés de la tige; pétales à lame arrondie ou subtronquée; éperon recourbé en crochet, égalant la longueur de la lame; étamines égalant la lame; filets stériles subaigus; follicules petits.

Bois et rochers des Alpes: Hautes-Alpes; Basses-Alpes; Alpes-Maritimes; Var et Vaucluse. — Ligurie et Piémont. = Juin-août.

113. — *A. vulgaris* L. *A. commune*. — Tige de 30 cm. à 1 mètre, pubescente, rameuse dans le haut; feuilles inférieures longuement pétiolées, biternées, à folioles larges de 3-4 cm., incisées peu profondément, les supérieures sessiles, à lobes souvent entiers; fleurs bleues, rarement roses ou blanches, grandes, longuement pédonculées, en panicule lâche; pétales à lame arrondie ou tronquée; éperon recourbé en crochet, égalant la lame ou plus court; étamines dépassant un peu la lame; filets stériles obtus; follicules grands, ventrus.

Varie à fleurs petites, d'un violet noirâtre, à étamines longuement saillantes et à folioles plus découpées (*A. atrata* Koch).

Bois et prés ombragés, dans presque toute la France. — Presque toute l'Europe; Sibérie; Inde. = Mai-juillet.