



Papaver hispidum.



Papaver Argemone.



Papaver somniferum



Papaver Rhœas.

123. — *Papaver hispidum* Lamk. (*P. HYBRIDUM* L.) — Plante annuelle, assez mollement velue; tige de 20-50 cm., ordinairement rameuse et dressée; feuilles bi-tripennatifidées, à lobes lancéolés-linéaires, les caulinaires sessiles; fleurs d'un rouge violacé, assez petites; sépales très velus-hérissés; filets des étamines épaissis dans le haut; stigmates 4-8, sur un disque sinué, non lobé; capsule ovoïde-subglobuleuse, arrondie à la base, toute hérissée de soies étalées-arquées.

Champs et moissons dans presque toute la France. — Europe centrale et méridionale; Asie occidentale jusqu'à l'Inde; Afrique septentrionale. = Mai-juillet.

124. — *P. Argemone* L. — Plante annuelle, assez mollement velue; tige de 10-40 cm., simple ou rameuse, dressée ou ascendante; feuilles bi-tripennatifidées, à lobes lancéolés-linéaires, les caulinaires sessiles; fleurs d'un rouge clair, assez petites; sépales peu velus; filets des étamines épaissis dans le haut; stigmates 4-6, sur un disque sinué, non lobé; capsule oblongue en massue, atténuée à la base, hérissée, au moins au sommet, de soies arquées-dressées.

Varie à fleurs petites, à capsule petite, oblongue, non en massue, à soies dressées (*P. MICRANTHUM* Bor.).

Champs et moissons, dans toute la France. — Europe méridionale et centrale jusqu'à la Suède; Asie occidentale. = Mai-juillet.

125. — *P. somniferum* L. *Pavot*. — Plante annuelle, très glauque; tige de 40 cm. à 1 mètre, robuste, creuse, peu rameuse; feuilles grandes, incisées-dentées, les caulinaires embrassantes; fleurs rougeâtres, rosées ou blanches, très grandes; filets des étamines blancs, en massue; stigmates 8-15, sur un disque à lobes profonds, écartés; capsule grosse, subglobuleuse, glabre.

Varie à feuilles et pédoncules hérissés de longues soies (*P. SETIGERUM* D. C.); à feuilles glabres, avec capsule de la grosseur d'une noisette, à pores déhiscent (P. *HORTENSE* HUSS.), ou du volume d'une grosse noix, à pores indéhiscent (P. *OFFICINALE* Gmel.).

Lieux incultes, dans la région méditerranéenne jusque dans l'Aveyron. — Europe méridionale; Afrique septentrionale. = Mai-juillet. — Cultivé pour ses fleurs, ses capsules et ses graines.

126. — *P. Rhœas* L. *Coquelicot*. — Plante annuelle, velue-hérissée; tige de 20-60 cm., dressée, rameuse; feuilles pennatifidées, à segments lancéolés-aigus, incisés-dentés, les caulinaires sessiles, à segment terminal très développé; pédoncules à poils très étalés; fleurs d'un rouge vif, grandes; filets des étamines filiformes; stigmates 7-12, sur un disque lobé, à lobes se recouvrant par les bords; capsule courtement obovale, glabre. Plante polymorphe.

Champs et moissons, dans toute la France. — Europe centrale et méridionale; Asie occidentale et centrale; Afrique septentrionale. = Mai-juillet. — Plante pectorale; nuisible aux moissons.