

127. — *Papaver obtusifolium* Desf. — Plante annuelle, velue-hérissée; tige de 30-60 cm., dressée, rameuse; feuilles grandes, bipennatifidées, à lobes ovales-oblongs, arrondis, à dents obtuses, les caulinaires sessiles; pédoncules à poils appliqués; fleurs d'un rouge assez pâle ou violacé; filets des étamines filiformes; anthères jaunâtres; stigmates 7-10, sur un disque lobé, à lobes se recouvrant par les bords; capsule oblongue, un peu arrondie à la base, glabre.

Vignes, à Rogliano dans la Corse. — Sardaigne; Sicile; Algérie. = Mai-juin.

128. — *P. pinnatifidum* Moris. — Plante annuelle, velue-hérissée; tige de 30-60 cm., dressée, rameuse; feuilles pennatifides ou pennatifidées, à lobes ovales, les supérieures sessiles; fleurs d'un rouge écarlate; filets des étamines filiformes; anthères jaunes; stigmates 6-8, sur un disque crénelé-lobé, à lobes se touchant ou se recouvrant par leurs bords; capsule longuement conique, étroite, insensiblement atténuée à la base, glabre.

Lieux cultivés et incultes, dans les Alpes-Maritimes. — Sardaigne; Sicile; Italie méridionale. = Mars-mai.

129. — *P. dubium* L. — Plante annuelle, velue; tige de 20-60 cm., dressée, rameuse; feuilles glaucescentes, pennatifidées, à segments lancéolés-aigus, incisés-dentés, les supérieures sessiles, à segment terminal peu apparent; pédoncules très longs, à poils appliqués; fleurs d'un rouge vif, assez grandes; filets des étamines filiformes; anthères violacées; stigmates 4-12, sur un disque à lobes peu marqués, se recouvrant peu ou point par les bords; capsule assez épaisse, en massue, glabre. Plante polymorphe.

Lieux incultes et cultivés, moissons, dans toute la France. — Presque toute l'Europe; Asie occidentale jusqu'à l'Inde; Afrique septentrionale. — Mai-juillet.

Genre 25. — MECONOPSIS Vig.

(Du grec *mécôn*, pavot, *opsis*, aspect : plante ayant la ressemblance du pavot.)

9 espèces habitant l'Europe occidentale, l'Asie centrale et l'Amérique septentrionale.

130. — *Meconopsis cambrica* Vig. — Plante vivace, à suc laiteux; tige de 30-80 cm., dressée, rameuse; feuilles un peu velues, glauques en dessous, pennatifidées, à segments obovales, incisés-dentés; fleurs d'un jaune soufre, devenant orangées, grandes, solitaires, longuement pédonculées, penchées avant l'épanouissement; pétales chiffonnés dans le bouton; style court; stigmates 4-6, libres, très convexes, rayonnants; capsule elliptique en massue, glabre, à 1 loge, sans cloisons, s'ouvrant au sommet par 4-6 valves.

Bois et lieux ombragés, dans les Pyrénées et les montagnes du Plateau central jusque dans la Côte-d'Or. — Jura suisse; Espagne; Grande-Bretagne. = Juin-août.



Papaver obtusifolium.



Papaver pinnatifidum.



Papaver dubium.



Meconopsis cambrica.