




Corydalis lutea.

**139.** — *Corydalis lutea* D. C. — Racine vivace, fibreuse; tiges de 20-30 cm., ascendantes, rameuses, non grimpantes, feuillées; feuilles bi-tripennatiséquées, à segments pétiolulés, obovales en coin, entiers ou bi-trifides; pétioles sans vrille; bractées lancéolées-cuspidées, bien plus courtes que le pédicelle; fleurs jaunes, plus foncées au sommet, assez grandes, en grappes dressées, opposées aux feuilles; *éperon court et obtus*; pédicelles égalant la capsule; capsule à 1 nervure sur chaque face, à graines finement ponctuées.

Vieux murs et rochers, çà et là dans toute la France, mais seulement échappé des cultures ou naturalisé. — Italie; Suisse; Allemagne. = Avril-septembre. — Cultivé comme ornement.

*A 29* *Corydalis ochroleuca* var. *naturalis*  
en Suisse et en France



Corydalis cava.

**140.** — *C. cava* Schw. — Souche vivace, renflée en bulbe creux, par dessous; tige de 10-30 cm., simple, portant 1-2 feuilles, sans écaille au-dessous des feuilles; feuilles bi-tripennatiséquées, à segments ovales-oblongs, en coin à la base, incisés-lobés; bractées ovales, entières; fleurs purpurines, blanches ou panachées, en grappe terminale, dressée, s'allongeant après la floraison; *éperon long, courbé et arrondi au sommet*; pédicelle trois fois plus court que la capsule.

Haies et bois, dans l'Est, depuis la Lozère et l'Isère jusqu'à l'Alsace-Lorraine. — Europe méridionale et centrale, du Portugal à la Suède et au Caucase. = Avril-mai.



Corydalis fabacea.

**141.** — *C. fabacea* Pers. — Souche vivace, renflée en bulbe plein et solide; tige de 5-10 cm., simple, portant 1-2 feuilles, avec 1 écaille au-dessous des feuilles; feuilles 1 ou 2 fois pennatiséquées, à segments oblongs, en coin à la base, incisés; bractées ovales, entières; fleurs purpurines, en grappe terminale, courte, ne s'allongeant pas, mais se réfléchissant après la floraison; *éperon long, droit, atténué au sommet*; pédicelle 3-4 fois plus court que la capsule.

Varie à bractées incisées-digitées (var. *DIGITATA* G. G.; *C. PUMILA* Reich.).

Bois et broussailles, dans les montagnes de l'Est: Ardennes; Vosges; Alpes de la Savoie et du Dauphiné; Corse. — Europe centrale, de la Suède à la Russie méridionale. = Avril-mai.



Corydalis solida.

**142.** — *C. solida* Swartz. — Souche vivace, renflée en bulbe plein et solide; tige de 10-30 cm., simple, portant 2-4 feuilles, avec 1-3 écailles au-dessous des feuilles; feuilles 2 fois triséquées, à segments en coin, incisés-lobés; bractées herbacées, incisées-digitées, rarement dentées ou même entières; fleurs purpurines, parfois blanches, en grappe terminale, dressée, s'allongeant après la floraison; *éperon allongé, à peine courbé et atténué au sommet*; pédicelle de la longueur de la capsule.

Bois et taillis, dans presque toute la France; rare dans le Midi. — Europe centrale et méridionale; Asie boréale et occidentale. = Mars-mai.