

- Feuilles lyrées-pennatifides, à lobes oblongs; tiges, feuilles et siliques hérissées. *S. alba* 154
- Feuilles pennatifides, découpées en lobes lancéolés; tiges, feuilles et siliques glabrescentes. *S. dissecta* 155
- Siliques serrées contre l'axe; valves à 1 nervure ou sans nervures.
- Feuilles supérieures sessiles; rameaux élançés; valves de la silique sans nervures apparentes. *S. pubescens* 156
- Feuilles toutes pétiolées; rameaux divariqués; valves à 1 nervure bien marquée.
- Siliques cylindracées, à bec renflé au milieu en une boule monosperme; graines ovoïdes. *S. incana* 157
- Siliques presque quadrangulaires, à bec conique, sans graine au milieu; graines globuleuses. *S. nigra* 158



Sinapis arvensis.

153. — *Sinapis arvensis* L. *Moutarde des champs, Ravencelle.* — Plante annuelle, velue-hérissée; tige de 30-80 cm., dressée, rameuse; feuilles inférieures lyrées, les supérieures sessiles, ovales ou oblongues, sinuées-dentées; pédicelles fructifères épais, bien plus courts que les siliques; siliques étalées-dressées, oblongues, bosselées, glabres, rarement appliquées ou hérissées; valves à 3-5 nervures; bec conique, en aigle, un peu plus court que les valves; graines globuleuses, brunâtres, lisses.


Lieux cultivés, surtout calcaires, dans toute la France. — Presque toute l'Europe; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Mai-septembre. — Plante très nuisible x cultures.



Sinapis alba.

154. — *S. alba* L. *M. blanche.* — Plante annuelle, velue-hérissée; tige de 30-80 cm., dressée, simple ou rameuse; feuilles toutes pétiolées et lyrées-pennatifides, à segments sinués-dentés; pédicelles fructifères élançés, droits, aussi longs que les valves; siliques très étalées, courtes, oblongues, bosselées, hérissées de poils blancs; valves à 3 nervures saillantes; bec comprimé en sabre, atténué au sommet, plus long que les valves; graines 2-3 dans chaque loge, globuleuses, jaunâtres, finement ponctuées.

Lieux cultivés, dans presque toute la France; rare dans le Midi. — Europe; Asie occidentale jusqu'à l'Inde; Afrique septentrionale. = Mai-juillet. — La Moutarde blanche, souvent cultivée comme plante fourragère, a presque les mêmes propriétés que la Moutarde noire.



Sinapis dissecta.

155. — *S. dissecta* Lag. — Plante annuelle, glabrescente ou peu hispide; tige de 30-60 cm., dressée, presque lisse, rameuse; feuilles pennatifides, non lyrées, à lobes lancéolés, profondément incisés, le terminal à peine plus grand que les latéraux; pédicelles fructifères arqués-ascendants, égalant la siliqua; siliques dressées-étalées, glabrescentes ou un peu hérissées; valves à 3 nervures faibles; bec comprimé en sabre, atténué dès la base, plus long que la siliqua; graines globuleuses, brunes, finement alvéolées.

Lieux cultivés, en Corse; adventice çà et là dans le Midi de la France. — Europe méridionale, de l'Espagne à la Russie; Algérie. = Avril-juin.