

161. — Brassica Rapa L. (B. ASPERIFOLIA Link).
Rave. — Plante annuelle ou bisannuelle, herbacée; feuilles radicales vertes et hérissées de poils raides, lyrées-pennatifides, les supérieures glabres et glauques, largement embrassantes en cœur; fleurs d'un jaune d'or, grandes, rapprochées au moment de la floraison; sépales un peu étalés; étamines latérales ascendantes; siliques ascendantes; graines lisses.

Varie à racine grosse, charnue, comestible (var. ESCULENTA G. G., *Rave*); à racine grêle et à graines oléagineuses (var. OLEIFERA D. C., B. CAMPESTRIS L., *Nette*).

Plante cultivée partout pour sa racine et sa graine, spontanée çà et là dans toutes les régions. — Avril-juin. — Usages bien connus.



Brassica Rapa.

162. — B. Richeri Vill. — Plante vivace, glabre et glauque; tige de 20-30 cm., simple, nue ou presque nue au sommet; feuilles toutes pétiolées, oblongues ou obovales, entières ou sinuées-ondulées, les supérieures très petites, 1-2 ou nulles; fleurs jaunes, veinées, en corymbe dense; sépales dressés ou un peu étalés; grappe fructifère peu allongée, mais fournie, à pédicelles courts, étalés-dressés; siliques cylindriques, comprimées par le côté, non bosselées, veinées; valves à 3 nervures; graines noires, alvéolées.

Prairies et rocaillies élevées, dans les Alpes: Savoie; Isère; Hautes-Alpes et Basses-Alpes. — Piémont. — Juillet-aout.



Brassica Richeri.

163. — B. fruticulosa Cyr. — Plante bisannuelle ou vivace, glabre ou un peu hérissée dans le bas; tige de 20-30 cm., souvent sous-ligneuse à la base, à rameaux grêles, presque nus; feuilles toutes lyrées ou pennatifides, à bords scabres; fleurs d'un jaune clair, assez petites; sépales dressés, 1 fois plus courts que le pédicelle; grappe fructifère lâche, allongée, à pédicelles grêles, étalés-dressés, presque aussi longs que la silique; siliques bosselées, un peu comprimées, stipitées; valves à 1 nervure; graines brunes.

Vignes et bords des ormes. — Alpes, Italie. — Mars-juin.



Brassica fruticulosa.

164. — B. Cheiranthus Vill. (SINAPIS CHEIRANTHUS Koch). — Plante annuelle ou bisannuelle, hérissée dans le bas; tige de 20 cm. à 1 mètre, arrondie, dressée, rameuse; feuilles toutes pétiolées et pennatifides, les supérieures à lobes lancéolés ou linéaires; fleurs jaunes, grandes; sépales dressés, un peu plus longs que le pédicelle; grappe fructifère allongée, à pédicelles courts, épais, étalés-dressés; siliques longues, bosselées; valves à 3 fortes nervures; bec plus court que la silique; graines brunes, ponctuées.

Varie à souche vivace et à grappes courtes (B. MONTANA D. C.); à siliques courtes et à bec aussi long que les valves (B. RECTANGULARIS Viv.; B. SABULARIA G. G., non Brot.)

Champs et coteaux siliceux, dans toute la France; Corse. — Europe occidentale, de l'Ecosse au Portugal et à l'Italie. — Mai-aout.



Brassica Cheiranthus.