

**166. — *Diptotaxis humilis* G. G. (*D. REPANDA* G. G.).**

— Plante vivace, portant à la base les débris des anciennes feuilles; tiges de 5-15 cm., simples, nues; feuilles toutes radicales, pennatifides ou presque entières; fleurs jaunes, assez grandes, 4-8 en corymbe dense; *sépales dressés, aussi longs que le pédicelle*; grappe fructifère courte, très large, à pédicelles étalés ou réfléchis; *siliques larges, raides, redressées, étalées ou réfléchies*; graines ovoïdes, brunes, lisses ou finement ponctuées, sur 1 rang.

Rocailles et coteaux des montagnes du Sud-Est: Héruault et Gard; Bouches-du-Rhône; Alpes de la Provence, du Dauphiné et de la Savoie. — Piémont. = Avril-août.

*Diptotaxis humilis.***167. — *D. brassicoides* Rouy (*D. BLANCOANA* Boiss.).**

— Plante vivace, portant à la base les débris des anciennes feuilles; tiges de 10-30 cm., robustes, simples, nues; feuilles toutes radicales, courtes, un peu épaisses, pennatifides ou presque entières; fleurs jaunes, grandes, 6-25 en corymbe lâche; *sépales dressés, presque 1 fois plus courts que le pédicelle*; grappe fructifère allongée, à pédicelles ascendants; *siliques longues, étroites, redressées sur les pédicelles*; graines finement ponctuées, sur 1 rang.

Rocailles et éboulis calcaires des Pyrénées: Ariège et Hautes-Pyrénées. — Espagne; Maroc; Algérie. = Mai-juin.

*Diptotaxis brassicoides.***168. — *D. erucoides* D. C. — Plante annuelle, pu-**

bescence ou presque glabre; tige de 30-50 cm., rameuse dès la base, feuillée; feuilles inférieures lyrées, les supérieures sessiles, oblongues, sinuées-pennatifides; fleurs blanches veinées de rose ou lilacées; *sépales étalés, plus courts que le pédicelle*; grappe fructifère allongée, lâche, à pédicelles étalés et 2-3 fois plus courts que les siliques; *siliques ascendantes, comprimées, bosselées*; graines ovales, distinctement sur 2 rangs.

Vignes et champs cultivés, dans le Midi et le Sud-Ouest: Provence; Languedoc; Roussillon; Gers; Basses-Pyrénées; Charente et Charente-Inférieure. — Europe méditerranéenne; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Avril-juin.

*Diptotaxis erucoides.***169. — *D. tenuifolia* D. C. — Plante vivace, glabre,**

glaucescente, fétide; tige de 30-80 cm., sous-ligneuse à la base, robuste, dressée, très feuillée; feuilles inférieures pennatifides, à lobes latéraux linéaires entiers, les supérieures entières ou peu divisées; pédicelles 2-3 fois plus longs que le calice, et presque aussi longs que la silique; fleurs d'un jaune soufre, grandes, odorantes; *sépales étalés*; *pétales 2 fois plus longs que le calice*; *siliques redressées sur de longs pédicelles étalés*.

Sables, décombres, lieux vagues, dans presque toute la France; Corse. — Europe centrale et méridionale; Asie occidentale. = Mai-septembre.

*Diptotaxis tenuifolia.*