

*Hesperis matronalis.**Hesperis laciniata.*

175. — *Hesperis matronalis* L. *Julienne des dames*. — Plante bisannuelle ou vivace; tige de 40-80 cm., dressée, rameuse au sommet; feuilles oblongues ou lancéolées, dentées, rudes, les supérieures brièvement pétiolées; fleurs lilacées, blanches ou panachées, odorantes; sépales égalant le pédicelle ou pins courts; grappe fructifère longue, peu fournie; siliques ascendantes, grêles, flexueuses ou courbées, glabres ou finement pubescentes.

Hales, bois, buissons, dans le Centre et les régions montagneuses; rare dans les plaines du Nord, de l'Ouest et du Midi. — Europe centrale et méridionale; Asie boréale et occidentale. = Mai-juin. — Souvent cultivé.

176. — *H. laciniata* All. — Plante bisannuelle; tige de 30-40 cm., souvent rameuse dans le bas, glanduleuse dans le haut; feuilles oblongues ou lancéolées, les inférieures incisées ou pennatifides à la base, les supérieures sessiles; fleurs rouges ou violacées, rarement d'un jaune pâle; sépales environ 2 fois plus longs que le pédicelle; grappe fructifère allongée, lâche, à pédicelles étalés; siliques divariqués, droites ou courbées, pubescentes-glanduleuses.

Rochers et éboulis, dans la région méditerranéenne, depuis les Alpes-Maritimes jusqu'à la frontière d'Espagne. — Espagne; Italie. = Mai-juillet.

Genre 40. — **MALCOLMIA** R. Br.

(Dédié à *Malcolm*, jardinier anglais.)

Sépales dressés, égaux ou les latéraux bossus à la base; stigmate fendu en 2 petites lames conniventes, aiguës, rarement discoïde et obtus; siliques écartées de l'axe, linéaires-cylindriques; valves convexes, à 1 nervure; bec conique en aigle, rarement cylindrique; graines ovales, comprimées, non ailées, sur 1 rang.

Fleurs violettes ou purpurines; feuilles entières ou sinuées-dentées, rarement pennatifides; plantes pubescentes-blanchâtres ou grisâtres.

Environ 26 espèces habitant l'Europe, l'Asie centrale et occidentale, l'Afrique septentrionale.

TABLEAU DES ESPÈCES

Plante blanche-tomentueuse, vivace, à souche ligneuse; style allongé, très caduc.

***M. littorea* 177**

Plantes d'un vert cendré, annuelles; style persistant.

Pédicelles 3-4 fois plus courts que les sépales; siliques s'ouvrant tardivement, atténuées en stigmate aigu.

Sépales latéraux bossus; pétales grands, obovales; style allongé.

***M. maritima* 178**

Sépales tous égaux; pétales petits, oblongs; style court. . . ***M. africana* 179**

Pédicelles égalant à peu près les sépales; siliques promptement déhiscents, à stigmate obtus.

Stigmate conique, bifide, à lobes aigus et rapprochés; cloison opaque, à peine transparente aux bords. . . ***M. parviflora* 180**

Stigmate discoïde, tronqué, échancré, à lobes écartés, arrondis; cloison largement transparente sur les côtés. . . ***M. binervis* 181**