

Pétales d'un blanc pur; anthères violettes; style filiforme, aigu.

C. amara 242

Pétales lilas ou roses, rarement blancs; anthères jaunes; style court et obtus.

Feuilles toutes lyrées, à lobe terminal grand, orbiculaire, les latéraux ovales-arrondis. *C. latifolia* 243

Feuilles supérieures pennées, à lobes presque égaux, linéaires ou lancéolés-oblongs *C. pratensis* 244

• Pétales étroits, dressés, dépassant peu le calice.

Plantes vivaces, peu élevées; feuilles de la tige entières ou à 3-7 lobes; siliques dressées.

Feuilles entières ou sinuées-trilobées; siliques atteignant la même hauteur; graines non ailées *C. alpina* 243

Feuilles de la tige pennatisées, à 3-7 lobes; siliques n'atteignant pas la même hauteur; graines ailées. *C. resedifolia* 246

Plantes annuelles ou bisannuelles; feuilles pennatiséquées, à lobes nombreux; siliques écartées de l'axe.

Fleurs dépassées par les jeunes siliques; grappes fructifères courtes; plantes hérissées à la base.

Feuilles de la tige 4-3, petites, à 3-7 lobes linéaires ou oblongs; 4 étamines; plante annuelle. *C. hirsuta* 247

Feuilles de la tige 6-12, grandes, à 3-11 lobes obovales; 6 étamines; plante bisannuelle. *C. silvatica* 248

Fleurs non dépassées par les jeunes siliques; grappes fructifères longues; plantes glabres.

Feuilles de la tige auriculées, à lobes largis, incisés-dentés; pétales égalant à peine les sépales. *C. impatiens* 249

Feuilles de la tige non auriculées, à lobes linéaires, égaux, entiers; pétales 4 fois plus longs que les sépales *C. parviflora* 230

237. — *Cardamine asarifolia* L. — Plante glabre, d'un vert gai; souche grêle, écaillouse, noueuse, stolonifère; tige de 20-40 cm., feuillée; feuilles toutes réniformes, sinuées-crénées, épaisses, luisantes; fleurs blanches, grandes; pétales à limbe large, étalé, 2 fois plus longs que le calice; anthères violettes; grappe fructifère peu allongée, fournie, à rachis droit, à pédicelles grêles, étalés-dressés; siliques étalées-dressées, un peu bosselées; graines non ailées; funicules filiformes,

Lieux humides et ombragés des hautes montagnes, dans les Basses-Alpes et les Alpes-Maritimes. — Italie; Tyrol; Espagne. — Juillet-août.



Cardamine asarifolia.

238. — *C. trifolia* L. — Plante glabre, d'un vert sombre; souche grêle, écaillouse, noueuse, stolonifère; tige de 10-30 cm., grêle, nue ou à 1 petite feuille; feuilles triséquées, à 3 folioles arrondies, presque égales, pétiolées, crénées, épaisses, luisantes; fleurs blanches; pétales à limbe large, étalé, 2 fois plus long que le calice; anthères jaunes; grappe fructifère courte, peu fournie, à rachis droit, à pédicelles étalés-dressés, aussi longs que les siliques; siliques étalées-dressées, un peu bosselées; graines non ailées; funicules coniques.

Lieux humides et ombragés, dans le Jura, au mont Popillier. Seule localité française actuellement connue. — Europe centrale, du Jura à l'Italie et à la Transylvanie. — Avril-juin.



Cardamine trifolia.