

**243. — *Cardamine latifolia* Vahl.** — Plante vivace, glabre; souche épaisse, noueuse, allongée; tige de 30-60 cm., robuste, simple ou rameuse au sommet; feuilles grandes, toutes lyrées, à 3-7 folioles larges, la terminale grande, suborbiculaire, les latérales ovales-arrondies; fleurs lilacées, grandes; pétales étalés, 3 fois plus longs que le calice; anthères jaunes; grappe fructifère assez fournie, à pédicelles étalés-dressés, aussi longs que les siliques; siliques étalées-dressées, assez larges, ailées; graines non ailées; funicules filiformes.

Sources et ruisseaux, dans les Pyrénées, les Corbières, la Montagne Noire et les monts de Lacaune, dans le Tarn et l'Aveyron. — Espagne; Italie. — Mai-juillet.



Cardamine latifolia.

**244. — *C. pratensis* L. Cressonnette.** — Plante vivace, glabre; souche épaisse, courte, tronquée; tige de 20-40 cm., simple; feuilles inférieures lyrées, à folioles ovales-arrondies, les supérieures pennées, à 6-12 folioles presque égales, lancéolées, entières; fleurs lilacées, rarement blanches, grandes; pétales étalés, 3 fois plus longs que le calice; anthères jaunes; grappe fructifère assez longue, à pédicelles étalés-dressés, un peu plus courts que les siliques; siliques étalées-dressées, étroites, à bords relevés; graines non ailées; funicules filiformes.

Prés humides et ruisseaux, dans presque toute la France; rare dans le Midi. — Europe, surtout centrale et boréale; Sibérie; Amérique boréale. — Avril-juin. — Les feuilles de la Cressonnette se mangent en salade.



Cardamine pratensis.

**245. — *C. alpina* Willd.** — Plante vivace, gazonnante, glabre, d'un vert sombre; souche épaisse; tiges de 2-8 cm., dressées; feuilles ovales-rhomboïdales, entières ou sinuées-trilobées, les caulinaires presque sessiles, sans oreillettes à la base; fleurs 2-6, blanches, petites, en corymbe, s'épanouissant toutes ensemble; pétales à limbe étroit, dressé; grappe fructifère courte, à pédicelles dressés, égalant le tiers des siliques; siliques dressées, rapprochées, atteignant la même hauteur; graines non ailées.

Pelouses humides des hautes montagnes : Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées. — Pyrénées; Alpes; Carpates. — Juillet-août.



Cardamine alpina.

**246. — *C. resedifolia* L.** — Plante vivace, un peu gazonnante, glabre, d'un vert tendre; souche un peu épaisse; tiges de 3-12 cm., grêles; feuilles rarement entières, les caulinaires pennatifides, à 3-7 lobes ovales ou oblongs, à pétiole muni d'oreillettes embrassantes; fleurs blanches, assez petites, en corymbe, les extérieures fleurissant les premières; pétales 4 fois plus longs que le calice; grappe fructifère courte, à pédicelles dressés-étalés, égalant le tiers des siliques; siliques dressées, n'atteignant pas toutes la même hauteur; graines ailées.

Débris des roches siliceuses, dans les hautes montagnes : Alpes; Auvergne; Cévennes; Corbières; Pyrénées; Corse. — Europe centrale, de l'Espagne à la Silésie. — Juin-août.



Cardamine resedifolia.