

304. — *Iberis sempervirens* L. — Plante vivace; tiges de 10-20 cm., ligneuses et tortueuses à la base, diffuses, couchées, les florifères latérales et glabres; feuilles planes, linéaires-oblongues, obtuses, entières, ciliées, très nombreuses et rapprochées; fleurs blanches, assez grandes; sépales blanchâtres aux bords; filets des étamines violets au sommet; grappe fructifère assez lâche, à pédicelles étalés ou réfléchis; silicules grandes, ovales, largement ailées, à échancrure peu ouverte, à lobes ovales, aigus ou subaigus; style dépassant les lobes.

Rochers et éboulis des hautes montagnes : Pyrénées; Corbières; Basses-Alpes. — Europe méridionale, du Portugal à la Grèce; Asie Mineure. = Juin-août.

*Iberis sempervirens*

305. — *I. saxatilis* L. — Plante vivace; tiges de 5-15 cm., ligneuses et tortueuses à la base, diffuses, couchées, les florifères terminales et pubescentes; feuilles charnues, demi-cylindriques, linéaires, mucronées, entières, glabres ou ciliées, très nombreuses et rapprochées; fleurs blanches, assez grandes; sépales colorés aux bords; filets des étamines blancs; grappe fructifère assez dense, à pédicelles étalés ou réfléchis; silicules grandes, ovales, largement ailées, à échancrure ouverte, à lobes larges, arrondis; style plus court que les lobes.

Rochers et coteaux calcaires, dans l'Est et le Midi : Jura; Dauphiné; Provence; Cévennes; Corbières. — Espagne; Italie; Suisse; Tauride. = Mai-août.

*Iberis saxatilis*

306. — *I. amara* L. — Plante annuelle ou bisannuelle; tige de 10-40 cm., rameuse; feuilles spatulées, oblongues ou lancéolées, à 2-4 dents de chaque côté, ciliées ou pubérulentes; fleurs blanches ou lilacées; grappe fructifère à la fin allongée et lâche, à pédicelles étalés; silicules suborbiculaires, arrondies à la base, rétrécies au sommet, à échancrure étroite, à lobes triangulaires; style plus court ou un peu plus long que les lobes. Polymorphe.

Varie à feuilles lobées-pennatifides, à grappes fructifères assez courtes et denses, à silicules non rétrécies au sommet (*I. affinis* Jord.).

Champs et coteaux dans presque toute la France. — Europe centrale et méridionale; Algérie. = Mai-octobre.

*Iberis amara*

307. — *I. intermedia* Guers. — Plante bisannuelle, glabre; tige de 20-60 cm., dressée, rameuse au sommet; feuilles radicales un peu dentées, les caulinaires linéaires lancéolées ou linéaires, entières, éparses; fleurs blanches ou purpurines, assez grandes; grappe fructifère courte, assez dense, à pédicelles étalés; silicules ovales, ailées dès la base, non ou peu rétrécies au sommet, à lobes divergents; style un peu plus court ou plus long que les lobes. Plante polymorphe.

Varie à feuilles rapprochées et charnues, à lobes de la silicule dressés (*I. VIOLETTI* Soy.-Will.); à silicules petites, à peine ailées à la base, nettement rétrécies au sommet (*I. PAOSTII* Soy.-Will.).

Coteaux, bois et rochers calcaires : Seine-Inférieure; Meuse, Aube, Yonne, Côte-d'Or, Doubs; Ain, Isère, Drôme, Vaucluse; Cévennes. — Prusse rhénane; Istrie. = Mai-octobre.

*Iberis intermedia*