

*Iberis pinnata.**Iberis ciliata.**Iberis umbellata.**Iberis linifolia.*

**308. — *Iberis pinnata* L.** — Plante annuelle, pubescente; tige de 10-25 cm., dressée, rameneuse au sommet; feuilles pennatiséquées, décisées au sommet en 2-5 lobes linéaires, obtus; fleurs blanches ou lilacées, assez grandes; pétales contractés en onglet court; grappe fructifère courte, en corymbe dense, à pédicelles dressés; silicules presque carrées, aussi larges au sommet qu'au milieu, à échancrure assez profonde, à lobes obtus et divergents; style égalant ou dépassant les lobes.

Noisillons et cultures, dans tout le Midi et le Sud-Est, jusque dans la Saône-et-Loire et le Jura. — Europe méridionale, du Portugal à la Roumélie; Asie Mineure. = Mai-juillet.

**309. — *I. ciliata* All.** — Plante bisannuelle, pubescente ou glabre; tige de 20-30 cm., raide, flexueuse, rameneuse au sommet; feuilles ciliées, linéaires-spatulées, obtuses, très entières; fleurs blanches ou légèrement rosées, grandes; pétales oblongs en coin; grappe fructifère courte, en corymbe dense, à pédicelles dressés; silicules aussi larges au sommet qu'au milieu, ailées dès la base, à lobes triangulaires-aigus; style dépassant les lobes.

Lieux incultes et rochers, dans la région méditerranéenne, des Alpes-Maritimes aux Pyrénées-Orientales. Espèce spéciale au midi de la France. = Juin-juillet.

**310. — *I. umbellata* L.** — Plante annuelle, glabre; tige de 20-60 cm., robuste, à rameaux épais, ascendants; feuilles radicales et inférieures oblongues ou lancéolées, dentées, les moyennes et les supérieures linéaires-lancéolées, entières; fleurs roses ou purpurines, grandes; grappe fructifère courte, en corymbe dense, à pédicelles dressés; silicules ovales-arrondies, ailées dès la base, non rétrécies au sommet, à échancrure profonde, à lobes dressés, acuminés; style dépassant un peu les lobes.

Coteaux rocaillieux et boisés, dans les Alpes-Maritimes et le Var oriental. — Europe méridionale, de l'Espagne à l'Albanie. = Mai-octobre. — Plante souvent cultivée dans les parterres.

**311. — *I. linifolia* L.** — Plante bisannuelle, glabre; tige de 30-60 cm., grêle, à rameaux étalés-dressés; feuilles radicales lancéolées-linéaires, presque entières, les caulinaires étroitement linéaires, entières; fleurs roses ou lilacées, assez petites; pétales oblongs en grappe fructifère courte, en corymbe petit et serré, à pédicelles dressés; silicules petites, suborbiculaires, rétrécies et ailées seulement au sommet, à échancrure peu marquée, à lobes petits, aigus, divariqués; style dépassant longuement les lobes.

Varie à feuilles plus larges, à silicules plus largement ailées, à lobes allongés et acuminés (*I. stricta* Jord.).

Lieux incultes et rochers calcaires du Sud-Est : Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Ardèche, Drôme, Basses et Hautes-Alpes. — Italie, en Ligurie. = Août-octobre.