

383. — *Viola odorata* L. *Violette odorante*. — Plante acaule, pubescente; souche épaisse, émettant des stolons allongés, radicans, florifères; feuilles radicales adultes largement ovales en cœur, obtuses, crénelées, celles des stolons de l'année arrondies en rein; stipules ovales-lancéolées, à cils plus courts que la moitié de leur longueur; fleurs d'un violet foncé, rarement lilacées ou blanches avec éperon violacé, grandes, très odoriférantes; pédoncules glabres, les fructifères rouchés; sépales ovales, obtus; stigmat en crochet aigu; capsule subglobuleuse, violacée, pubescente. Plante polymorphe.

Haies, bois, prés, dans toute la France et en Corse. — Toute l'Europe; Asie occidentale jusqu'à l'Inde; Afrique septentrionale. = Mars-mai. — Les fleurs, béchiques et sudorifiques, donnent une teinture qui sert à reconnaître les alcalis; les feuilles et les racines sont purgatives et vomitives.



Viola odorata

384. — *V. arborescens* L. — Plante caulescente, pubescente-grisâtre; tiges de 10-20 cm., sous-ligneuses, naissant de la souche, ascendantes, très feuillées au sommet; feuilles ovales ou lancéolées-linéaires, entières ou denticulées; stipules linéaires, entières, égalant le tiers de la feuille; fleurs d'un violet pâle, petites; pédoncules sans bractées, les fructifères dressés; sépales lancéolés-aigus, ciliés; éperon court, obtus, dépassant peu les appendices; stigmat en crochet aigu; capsule ovale-trigone, obtuse, apiculée.


Coteaux et rochers de la région littorale, dans le Var, les Bouches-du-Rhône, l'Aude. — Baléares, Espagne et Portugal; Maroc et Algérie. = Août-septembre.



Viola arborescens.

385. — *V. canina* L. — Plante caulescente, glabre ou pubescente; tiges de 5-40 cm., herbacées, dressées ou ascendantes, naissant de la souche; feuilles ovales oblongues ou lancéolées, presque toujours obtuses, crénelées; stipules linéaires ou oblongues-lancéolées, frangées, plus courtes que le pétiole ou le dépassant peu; fleurs d'un bleu cendré ou d'un violet pâle, inodores; pédoncules bractéolés, les fructifères dressés; sépales lancéolés-aigus; éperon souvent jaunâtre, dépassant les appendices; stigmat en crochet aigu; capsule trigone, glabre. Plante très polymorphe.

Landes, prairies, bois, dans toute la France. — Toute l'Europe; l'Asie, depuis l'Oural et le Caucase jusqu'au Japon; Amérique du Nord. = Avril-juin.



Viola canina.

386. — *V. arenaria* D. C. — Plante caulescente, pubérulente, rarement glabre; tiges de 2-10 cm., naissant à l'aisselle des feuilles d'une rosette centrale; feuilles petites, en rein ou ovales en cœur, obtuses, crénelées; stipules grandes, ovales-lancéolées, frangées; fleurs d'un bleu pâle, petites, inodores; pédoncules fructifères dressés; sépales oblongs-lancéolés; éperon épais, violacé, 3-4 fois plus long que les appendices; stigmat en crochet aigu; capsule trigone, ordinairement pubérulente.

Varie à stipules étroites, sépales linéaires-lancéolés, n'égalant que le tiers des pétales, plante glabre (*V. insularis* G. G.).

Pelouses rocailleuses et lieux sablonneux des montagnes: Bugéy; Alpes de la Savoie, du Dauphiné et de la Provence; Causses des Cévennes; Pyrénées; Corse. — Europe centrale; Asie et Amérique boréales. = Avril-juin.



Viola arenaria.