

**391.** — *Viola sudetica* Willd. (*V. LUTEA* Sm.). — Plante vivace, glabre ou un peu velue, à souche grêle, traçante; tiges de 10-40 cm., radicales à la base; feuilles inférieures ovales en cœur, les supérieures lancéolées, un peu crénelées; *stipules digitées-multipartites*, à lobes inférieurs dirigés en bas, le médian plus grand, denté; fleurs violettes ou jaunâtres, grandes; sépales lancéolés-acuminés, plus courts que la corolle; *éperon grêle, souvent 2-3 fois plus long que les appendices; stigmat creusé en entonnoir*; capsule ovale, courte. Plante polymorphe.

Pelouses des montagnes granitiques ou basaltiques; Vosges; Auvergne et Plateau Central; Cévennes, Monts de Lacaune et Montagne Noire; Pyrénées, où il est rare. — Europe centrale, de la Grande-Bretagne à la Bosnie. = Mai-septembre.

*Viola sudetica.*

**392.** — *V. Bubanii* Timb. (*V. LUTEA* var. *PYRENAICA* G. G.). — Plante vivace, velue-hérissée, rarement glabrescente; tiges de 10-25 cm., grêles, ascendantes; feuilles inférieures arrondies, les supérieures oblongues, obtuses, crénelées; *stipules digitées-multipartites*, à lobes inférieurs dirigés en bas, le médian oblong; fleurs d'un violet foncé, assez grandes; sépales lancéolés-aigus, 2 fois plus courts que la corolle; *éperon gros, conique, 4-5 fois plus long que les appendices* abondamment ciliés; *stigmat creusé en entonnoir*; capsule oblongue, un peu apiculée.

Pâturages élevés des Pyrénées françaises et espagnoles. = Juin-septembre.

*Viola Bubanii.*

**393.** — *V. calcarata* L. — Plante vivace, glabre ou un peu hispide; tiges courtes, nues inférieurement, ascendantes; feuilles ovales ou oblongues-lancéolées, presque toutes ramassées en rosette, dentées ou presque entières; *stipules pennatifides, à 2-4 lobes étroits, l'inférieur petit, non réfléchi, le médian linéaire-oblong, entier*; fleurs violettes ou jaunes, grandes, longuement pédonculées; *sépales lancéolés, non acuminés, à appendices non ciliés; éperon grêle, plus long que les sépales et égalant les pétales; stigmat creusé en entonnoir.*

Pelouses des hautes montagnes; toute la chaîne du Jura; Alpes de la Savoie, du Dauphiné et de la Provence. — Europe centrale et méridionale, de la Bavière à la Sicile et à la Grèce. = Juillet-août.

*Viola calcarata.*

**394.** — *V. cornuta* L. — Plante vivace, glabrescente; tiges de 10-30 cm., feuillées dès la base, ascendantes; feuilles inférieures arrondies, les autres ovales, en cœur ou tronquées à la base, crénelées; *stipules grandes, incisées-dentées, à lobe médian triangulaire*; fleurs bleues, grandes, longuement pédonculées; *sépales lancéolés-linéaires*; *éperon très long, atténué au sommet, 5-6 fois plus long que les appendices; stigmat creusé en entonnoir*; capsule obtuse.

Pâturages de la région alpine et subalpine des Pyrénées; Haute-Savoie, pâturages de Grammont. — Italie, dans les Apennins; Espagne. = Juin-août.

*Viola cornuta.*