




Lychnis pyrenaica.



Lychnis Flos-cuculi.



Lychnis Viscaria.



Lychnis alpina.

466. — Lychnis pyrenaica Berg. (*PETROCOPTIS PYRENAICA* A. Br.). — Plante vivace, glabre et glauque, gazonnante; tiges de 5-15 cm., grêles, fragiles, ascendantes, latérales, naissant à l'aisselle des feuilles d'une rosette centrale; feuilles inférieures obovales, les *caulinaires* largement ovales-aiguës; fleurs blanches, dressées, en cyme dichotome lâche; calice en cloche, à la fin en massue, à 10 nervures, un peu ombiliqué, à dents arrondies; pétales entiers ou émarginés; capsule ovoïde, un peu plus longue que le carpophore, sans cloisons, à 5 dents; graines lisses et luisantes.

Rochers et coteaux stériles, dans les Pyrénées occidentales et centrales; Corbières, au pic de Madres. — Espagne septentrionale. = Mai-août.

467. — L. Flos-cuculi L. *Fleur de coucou*. — Plante vivace, légèrement pubescente, à souche stolonifère; tiges de 30-60 cm., dressées, hispides surtout à la base, un peu visqueuses dans le haut; feuilles oblongues-lancéolées, glabres, ciliées à la base, les supérieures lancéolées-linéaires; fleurs roses, en cyme dichotome lâche; calice en cloche, non ombiliqué, glabre, souvent rougeâtre, à 10 nervures saillantes, à dents triangulaires-acuminées; pétales découpés en lanières linéaires divergentes et inégales; capsule ovoïde, sans carpophore, ni cloisons, à 5 dents.

Prairies et bois humides, dans presque toute la France et en Corse; rare dans la région méditerranéenne. — Europe, surtout centrale et septentrionale; Sibérie et Caucase. = Mai-juillet.

468. — L. Viscaria L. (*VISCARIA VULGARIS* Trev.; *V. PURPUREA* Wimm.). — Plante vivace, glabre, à souche dure; tiges de 20-60 cm., simples, rougeâtres et très visqueuses dans le haut; feuilles oblongues-lancéolées, glabres, ciliées à la base, les supérieures linéaires-aiguës; fleurs rouges, brièvement pédonculées, en panicule étroite, longue et interrompue; calice oblong en massue, ombiliqué, glabre, rougeâtre, à 10 nervures peu marquées, à dents triangulaires-aiguës; pétales tronqués, à peine émarginés, à onglet auriculé; capsule ovoïde, égalant le carpophore glabre, à 3 loges à la base, à 5 dents; graines canaliculées sur le dos.

Lieux secs et montueux, dans l'Est et le Centre, de l'Alsace aux Alpes-Maritimes, à l'Aveyron, à la Corrèze et au Loir-et-Cher; rare dans le Nord. — Europe, surtout centrale et septentrionale; Sibérie et Caucase. = Mai-juillet.

469. — L. alpina L. (*VISCARIA ALPINA* Don). — Plante vivace, glabre, gazonnante; tiges de 4-12 cm., simples, non visqueuses; feuilles oblongues ou lancéolées-linéaires, glabres, ciliées à la base; fleurs roses, rarement blanches, brièvement pédonculées, serrées en têtes corymbiformes; calice en cloche, non ombiliqué, à dents arrondies; pétales bifides, à onglet non auriculé; capsule ovoïde, bien plus longue que le carpophore glabre, à 3 loges à la base, à 5 dents; graines planes sur le dos.

Pelouses et rochers des hautes montagnes siliceuses: Alpes de la Savoie et du Dauphiné; Pyrénées orientales et centrales. — Alpes et Pyrénées; Europe, Asie et Amérique boréales. = Juillet-août.