




Saponaria Vaccaria.



Saponaria officinalis.



Saponaria ocymoides.



Saponaria bellidifolia.

**472. — Saponaria Vaccaria L.** (GYPSOPHILA VACCARIA Sibth.; VACCARIA PARVIFLORA Moench). — Plante annuelle, glabre et glauque, à racine pivotante; tige de 30-60 cm., dressée, rameuse, feuillée; feuilles oblongues-lancéolées, sessiles, à 1 nervure; fleurs roses, longuement pédonculées, en cyme dichotome lâche; calice ovoïde-pyramidal, non ombiliqué, à 5 angles verts et ailés, à dents triangulaires-acuminées; pétales à limbe court, denté, sans écailles à la gorge; capsule ovoïde, incluse, à carpophore très court, à dents courtes.

Moissons des terrains calcaires ou argileux, dans presque toute la France. — Europe centrale et méridionale; Asie occidentale jusqu'à l'Inde; Afrique septentrionale. = Juin-juillet.

**473. — S. officinalis L.** Saponaire, Savonnière. — Plante vivace, glabrescente, verte, à souche rampante; tiges de 30-50 cm., dressées, robustes; feuilles grandes, ovales ou lancéolées, à 3-5 nervures; fleurs d'un rose pâle, grandes, odorantes, brièvement pédonculées, fasciculées en cyme compacte; calice cylindrique, ombiliqué, glabre ou pubescent, à 15-20 nervures, à dents courtes, acuminées; pétales presque entiers, couronnés d'écailles linéaires et planes; capsule oblongue, bien plus longue que le carpophore épais et court, à dents roulées en dehors.

Lieux incultes et frais, dans toute la France et en Corse. — Presque toute l'Europe; Asie occidentale. = Juin-septembre. — Plante amère, sudorifique, dépurative; elle mousse dans l'eau par le froissement et sert à nettoyer les étoffes de laine.

**474. — S. ocymoides L.** — Plante vivace, velue, glanduleuse au sommet; tiges de 20-40 cm., couchées-étalées, diffuses; feuilles petites, elliptiques ou oblongues, ciliées, à 1 nervure; fleurs d'un rose vif, inodores, courtement pétiolées; en grappes dichotomes corymbiformes; calice cylindrique, ombiliqué, velu-glanduleux, à 15-20 nervures, à dents longues et obtuses; pétales inégalement distants, obovales, presque entiers, à gorge munie de cornes obtuses; capsule ovoïde, 4 fois plus longue que le carpophore glabre.

Coteaux pierreux et rochers calcaires, dans le Midi, le Centre et l'Est, jusqu'à la Haute-Saône, la Côte-d'Or et le Puy-de-Dôme; Corse. — Espagne et Portugal; Sardaigne et Italie; Suisse, Bavière, Tyrol, Carinthie. = Mai-juillet.

**475. — S. bellidifolia Sm.** — Plante vivace, glabrescente, à souche ligneuse; tiges de 20-50 cm., raides, dressées, simples, portant 1-3 paires de feuilles linéaires-lancéolées, connées; feuilles radicales en rosette, longuement pétiolées, épaisses, spatulées, obtuses, à 3 nervures; fleurs d'un jaune pâle, petites, inodores, en tête globuleuse serrée et entourée de bractées; calice subcylindrique, un peu poilu, à dents triangulaires-aiguës; pétales linéaires, bidentés ou crénelés; à écailles presque nulles à la gorge; étamines longuement saillantes; capsule oblongue, à carpophore court et épais.

Pelouses rocailleuses et sables dolomitiques du Larzac, à la dévèze de Lapanouse (Aveyron). — Europe méridionale; Italie, Dalmatie, Albanie, Bosnie, Transylvanie, Serbie, Grèce. = Juin-juillet.