




Dianthus gallicus.



Dianthus Caryophyllus.



Dianthus subacaulis.



Dianthus serratus.

488. — *Dianthus gallicus* Pers. — Plante vivace, glauque, pubérulente à la base; tiges de 15-25 cm., simples, arrondies; feuilles courtes, raides, linéaires-subobtus, presque planes, à 3 nervures; fleurs roses, rarement blanches, odorantes, 1-3 au sommet de la tige; écailles du calicule 4, courtes, contractées en pointe appliquée atteignant le quart du tube du calice; calice cylindrique, strié dans toute sa longueur; pétales contigus, divisés jusqu'au tiers en lanières linéaires-aiguës, à partie non divisée suborbiculaire; capsule cylindrique.

Sables maritimes de l'Océan, de la frontière d'Espagne au Finistère. — Espagne occidentale et Portugal. = Juin-septembre.

489. — *D. Caryophyllus* L. *Œillet Giroflée, Œillet des fleuristes*. — Plante vivace, glabre, à souche ligneuse émettant des jets allongés; tiges de 40-80 cm., feuilles largement linéaires, subobtus, canaliculées, les supérieures bractéiformes; fleurs rouges ou roses, odorantes, solitaires ou en panicule; écailles du calicule 4, courtes, larges, striées au sommet, brusquement mucronées, 4-5 fois plus courtes que le calice; calice long de 25-30 mm.; pétales contigus, glabres, dentés; capsule cylindrique. Polymorphe.

Varie à jets stériles courts, avec calicule à 6-8 écailles striées jusqu'à la base (*D. siculus* Presl.); feuilles étroitement linéaires, fleurs inodores, calicule à 2 écailles (*D. silvestris* Wulf.); feuilles linéaires en alène, triquètres, fleurs odorantes à pétales non contigus, calicule à 4-6 écailles (*D. virginicus* L.).

Coteaux arides, murs et rochers, dans tout le Midi et l'Est; rare dans le Centre et l'Ouest; Corse. — Europe méridionale; Algérie et Maroc. = Juin-septembre.

490. — *D. subacaulis* Vill. (*D. brachyanthus* Boiss.). — Plante vivace, glabre, gazonnante, à souche ligneuse; tiges de 3-30 cm., anguleuses, simples; feuilles courtes, raides, linéaires en alène; fleurs roses, assez petites, inodores, solitaires; écailles du calicule larges, courtes, à pointe courte, atteignant du tiers à la moitié du calice; calice court, de 8-12 mm., ventru, strié dans le haut, à dents ovales-obtus; pétales non contigus, entiers ou crénelés, glabres à la gorge; capsule conique. Polymorphe.

Rochers et pelouses rocailleuses, surtout calcaires, des montagnes du Midi; Alpes du Dauphiné et de la Provence; Cévennes; Corbières, Albères et Pyrénées orientales; Lot et Tarn-et-Garonne. — Espagne. = Mai-août.

491. — *D. serratus* Lapeyr. (*D. pungens* G. G. part.). — Plante vivace, glabre et glauque, à souche ligneuse; tiges de 40-40 cm., un peu anguleuses, grêles; feuilles étroitement linéaires en alène, raides, presque piquantes; fleurs roses, 1-4 au sommet de la tige, assez longuement pédonculées; écailles du calicule 4, étalées, larges, contractées en pointe courte, atteignant le milieu du calice; calice assez court, de 13-15 mm., large, nettement conique, strié dans toute sa longueur, à dents lancéolées-acuminées; pétales non contigus, glabres, presque entiers; capsule oblongue.

Rocailles, dans les Pyrénées-Orientales. — Catalogne. = Juin-juillet.