



Arenaria lesurina.



Arenaria cinerea.



Arenaria montana.



Arenaria ciliata.

**543.** — *Arenaria lesurina* Loret (*A. ligerricina* Lec. et Lamot.). — Plante vivace, pubescente-glanduleuse, à souche sous-ligneuse; tiges de 40-40 cm., nombreuses, diffuses, étalées-ascendantes; feuilles pubescentes, largement lancéolées, longuement atténuées à la base; brièvement acuminées, à 1 nervure; fleurs en panicules étalées et très lâches; pédicelles 3-5 fois plus longs que le calice; *sépales pubescents-glanduleux, lancéolés, à 3-5 nervures, la médiane plus saillante*; *pétales oblongs en coin, d'un tiers plus longs que les sépales*; capsule ovoïde, dépassant peu le calice; graines finement tuberculeuses.

Rochers calcaires et sables dolomitiques, dans les grands causses de la Lozère et de l'Aveyron. — Espèce spéciale aux Cévennes-dolomitiques. = Mai-août.

**544.** — *A. cinerea* DC. — Plante vivace, brièvement pubescente, cendrée, non glanduleuse, à souche sous-ligneuse; tiges de 10-20 cm., nombreuses, diffuses, étalées-ascendantes; feuilles inférieures oblongues-lancéolées, les supérieures lancéolées-linéaires, pubescentes, ciliées à la base, à 1 nervure; fleurs en panicule étalée et lâche; pédicelles 4-6 fois plus longs que le calice, dressés; *sépales ovales-lancéolés, à 1 nervure devenant après la floraison une crête saillante fortement ciliée*; *pétales ovales-oblongs, 1 fois plus longs que les sépales*; capsule ovoïde-subglobuleuse, dépassant peu le calice; graines chagrinées.

Coteaux rocaillieux du Sud-Est, dans les Basses-Alpes et les Alpes-Maritimes. — Espèce spéciale à cette région. = Juin-août.

**545.** — *A. montana* L. — Plante vivace, brièvement pubescente, d'un vert grisâtre, non glanduleuse, à souche stolonifère produisant de longs rejets stériles; tiges de 10-30 cm., diffuses, couchées, redressées au sommet; feuilles pubérulentes, lancéolées, acuminées, à 1 nervure; fleurs grandes, en cymes très appauvries; pédicelles 1-3 fois plus longs que le calice, à la fin réfléchis; *sépales herbacés, ovales-lancéolés, à 1 nervure*; *pétales larges, obovales, 2 fois plus longs que les sépales*; capsule ovoïde-subglobuleuse, égalant le calice, à 3 valves bidentées; graines tuberculeuses.

Landes et bois de l'Ouest et du Centre, des Basses-Pyrénées au Finistère, à la Sarthe et au Char; Pyrénées; Cévennes granitiques. — Espagne et Portugal. = Mai-juillet.

**546.** — *A. ciliata* L. — Plante vivace, brièvement pubescente, émettant des rejets stériles; tiges de 5-25 cm., gazonnantes, étalées-ascendantes; feuilles ovales-aiguës, subsessiles, glabrescentes, ciliées à la base, à plusieurs nervures; fleurs petites, 1-6 au sommet des rameaux; pédicelles plus longs que le calice; *sépales ovales-lancéolés, à 3-5 nervures*; *pétales ovales-oblongs, d'un tiers plus longs que les sépales*; capsule ovoïde, égalant le calice; graines tuberculeuses.

Varie à feuilles suborbiculaires, fleurs en cymes denses à pédicelles plus courts que le calice ou l'égalant (*A. polycarpoides* Rouy).

Pelouses rocaillieuses des hautes montagnes calcaires; Jura; Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Hautes-Corbières et Pyrénées. — Europe, surtout boréale, jusqu'à l'Islande, le Spitzberg, le Groënland. = Juillet-août.