

antispasmodique très usités. Enfin les graines contiennent une huile grasse non siccative.

Environ 12 espèces habitant l'Europe, l'Asie tempérée, l'Amérique boréale.

#### TABLEAU DES ESPÈCES

- Feuilles grandes, vertes et mollement velues en dessous, à aisselles garnies de poils blanchâtres; bourgeons velus, à 3 écailles apparentes; fruit gros, obovoïde, à parois ligneuses, à 5 côtes très saillantes. . . . . *T. platyphylla* 609
- Feuilles assez grandes, vertes et glabrescentes en dessous, à aisselles garnies de poils roussâtres; bourgeons glabres, à 2 écailles apparentes; fruit assez gros, elliptique, à parois épaisses et résistantes, à 5 côtes saillantes. . . . . *T. intermedia* 610
- Feuilles petites, glauques et glabres en dessous, à aisselles garnies de poils roussâtres; bourgeons glabres, à 2 écailles apparentes; fruit petit, globuleux, à parois minces et fragiles, dépourvu de côtes saillantes. . . . . *T. parvifolia* 611

**609. — *Tilia platyphylla* Scop. (*T. GRANDIFOLIA* Ehrh.).** — Feuilles grandes, vertes-concolores sur les deux faces, glabres en dessus, mollement velues en dessous, avec les aisselles garnies de poils blanchâtres; bourgeons velus, revêtus de 3 écailles apparentes, imbriquées, la troisième complètement embrassante; fleurs d'un blanc jaunâtre, assez grandes, très odorantes, 2-3 par corymbe; stigmates dressés; fruit gros, obovoïde, velu, à parois épaisses et ligneuses, à 5 côtes très saillantes.


Bois, dans les régions de l'Est et du Midi. Très fréquemment planté dans les allées et les promenades. — Europe centrale et méridionale. = Fl. juin-juillet, fr. octobre.



*Tilia platyphylla.*

**610. — *T. intermedia* DC. (*T. VULGARIS* Hayn.).** — Intermédiaire entre le précédent et le suivant, dont il est peut-être un hybride. Feuilles assez grandes, vertes-concolores sur les deux faces, plus claires et glabrescentes en dessous, avec les aisselles garnies de poils roussâtres; bourgeons glabres, revêtus de deux écailles apparentes; fleurs assez grandes, blanchâtres, odorantes, nombreuses; fruit assez gros, elliptique, velu, à parois épaisses et résistantes, à 5 côtes saillantes.

Bois, dans les mêmes régions que le précédent, mais plus disséminé et rare. Fréquemment planté. — Presque toute l'Europe, de la Scandinavie à la Grèce et au Caucase. = Juin-juillet.



*Tilia intermedia.*

**611. — *T. parvifolia* Ehrh. (*T. SILVESTRIS* Desf.; *T. ULMIFOLIA* Scop.).** — Feuilles petites, suborbiculaires, vertes et glabres en dessus, glauques et glabres en dessous, avec les aisselles garnies de poils roussâtres; bourgeons glabres, à 2 écailles apparentes, la deuxième complètement embrassante; fleurs d'un blanc sale, petites, à odeur faible, 5-10 par corymbe; stigmates étalés; fruit petit, globuleux, tomenteux, à parois minces et fragiles, à côtes peu ou point saillantes.

Bois, dans presque toute la France et en Corse. Souvent planté. — Toute l'Europe, excepté l'extrême Nord; Sibérie. = Fl. juillet, fr. octobre.



*Tilia parvifolia.*