

Genre 115. — **MALVA L.** — *Mauve*.(Du grec *malacos*, mou : les Mauves sont émollientes.)

Calicule naissant de la base du calice, à 3 folioles distinctes, non soudées entre elles ; stigmates obtus ; fruit orbiculaire, déprimé au centre, composé de nombreux carpelles monospermes, rangés en cercle autour d'un axe central.

Fleurs roses, violacées ou blanches, axillaires et terminales ; feuilles à lobes crénelés, incisés ou découpés, les inférieures en cœur à la base ; plantes herbacées.

Les racines, les tiges et les feuilles des Mauves sont émollientes et fréquemment employées ; les fleurs sont béchiques ; les feuilles entrent dans la nourriture de quelques peuples de l'Orient.

Environ 16 espèces habitant les régions tempérées de l'ancien monde.

TABLEAU DES ESPÈCES

Fleurs axillaires solitaires, les terminales seules fasciculées ; calice enveloppant entièrement les carpelles noirs ou rougeâtres à la maturité.

Calice à divisions linéaires-allongées ; calicule à folioles linéaires deux fois plus courtes que le calice ; corolle égalant à peine le calice ; plante annuelle.

M. cretica 613

Calice à divisions ovales-triangulaires ; calicule à folioles égalant le tube du calice ; corolle 2-3 fois plus longue que le calice ; plantes vivaces.

Calicule à folioles ovales ou lancéolées ; carpelles glabres ou glabrescents, ridés sur les faces **M. Alcea** 614

Calicule à folioles linéaires-étroites, atténuées aux deux bouts ; carpelles velus-hérissés, lisses **M. moschata** 615

Fleurs axillaires et terminales toutes agglomérées en fascicules ; calice ne recouvrant pas les carpelles jaunâtres à la maturité.

Feuilles palmatifides ou palmatilobées, à lobes plus ou moins profonds ; calicule à folioles ovales ou oblongues.

Corolle grande, 3-4 fois plus longue que le calice, d'un rose violacé ; calicule à folioles oblongues ou elliptiques-lancéolées, plus courtes que le calice.

M. silvestris 616

Corolle petite, 1-2 fois plus longue que le calice, d'un blanc bleuâtre ; calicule à folioles larges, ovales-lancéolées, égalant à peu près le calice.

M. nicaensis 617

Feuilles toutes suborbiculaires, superficiellement lobées, crénelées ; calicule à folioles linéaires-étroites, plus courtes que le calice.

Corolle petite, 1-2 fois plus longue que le calice, blanche ou lilacée, à onglets barbus ; sépales peu accrescents, dressés sur le fruit ; carpelles lisses, à bords non dentés **M. rotundifolia** 618

Corolle très petite, dépassant à peine le calice, d'un blanc bleuâtre, à onglets glabres ; sépales très accrescents, larges, étalés ; carpelles fortement ridés, à bords ailés et dentés **M. parviflora** 619

613. — Malva cretica Cav. (M. ALTHÆOIDES G. G.).

— Plante annuelle, hérissée de poils étalés ; tiges de 10-30 cm., dressées ou étalées ; feuilles inférieures suborbiculaires, les autres palmatifides, à segments lancéolés ; fleurs roses veinées de pourpre, moyennes, axillaires, solitaires sur des pédoncules 1-2 fois plus longs que la feuille ; calicule à folioles linéaires-sétacées, deux fois plus courtes que le calice ; calice accrescent, à lobes étroitement lancéolés-linéaires ; corolle égalant à peu près le calice ; carpelles glabres, ridés en travers, rougeâtres à la maturité.

Lieux stériles, surtout calcaires, en Corse ; trouvé à la Farlède dans le Var. — Italie, Sardaigne, Sicile, Malte, Grèce, Crète ; Chypre ; Tunisie. = Mai-juin.



Malva cretica.