



Malva Alcea.



Malva moschata.



Malva silvestris.



Malva nicæensis.

**614. — *Malva Alcea* L.** — Plante vivace, couverte de poils la plupart étoilés; tiges atteignant 1 mètre, dressées, arrondies; feuilles inférieures suborbiculaires, les caulinaires simplement lobées ou profondément palmatipartites, à segments incisés-dentés; fleurs roses, grandes, solitaires à l'aisselle des feuilles, fasciculées au sommet; *calicule à folioles ovales ou lancéolées*, égalant le tube du calice; calice accrescent, à lobes largement triangulaires; *corolle 3-4 fois plus longue que le calice*; *carpelles glabres ou un peu hérissées, ridées*, noircissant à la maturité. Plante polymorphe.

Bois, haies, prés, surtout calcaires, dans toute la France et en Corse. — Europe, surtout centrale et méridionale. = Juin-septembre.

**615. — *M. moschata* L.** — Plante vivace, parsemée de poils la plupart simples; tiges de 30-60 cm., dressées, arrondies; feuilles radicales suborbiculaires, les autres profondément découpées en segments étroits; fleurs roses, grandes, solitaires à l'aisselle des feuilles, fasciculées au sommet; *calicule à folioles linéaires-étroites, atténues aux 2 bouts*, égalant le tube du calice; calice accrescent, à lobes largement triangulaires; *corolle 2-3 fois plus longue que le calice*; *carpelles velus*, lisses, noircissant à la maturité. Plante polymorphe.

Varie à carpelles ridés, ne noircissant pas, lobes du calice lancéolés, plante grêle dans toutes ses parties (*M. TOURNEFORTIANA* L.).

Bois, haies, prés, surtout siliceux, dans toute la France. — Europe, surtout occidentale et centrale; Maroc. = Juin-septembre.

**616. — *M. silvestris* L. *Grande Mauve.*** — Plante bisannuelle ou pérennante, munie de poils étalés; tiges de 30-50 cm., dressées ou ascendantes; feuilles palmatisées, à lobes plus ou moins profonds, crénelés; fleurs d'un rose violacé, veinées, grandes, en fascicules axillaires; *calicule à folioles oblongues ou elliptiques-lancéolées*, plus courtes que le calice; calice peu accrescent, à lobes largement triangulaires, ne cachant pas les carpelles à la maturité; *corolle 3-4 fois plus longue que le calice*; *carpelles glabres, ridées, jaunâtres à la maturité*. Plante polymorphe.

Décombres, haies, chemins, champs, dans toute la France et en Corse. — Toute l'Europe; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Juin-septembre.

**617. — *M. nicæensis* All.** — Plante annuelle, parsemée de poils raides; tiges de 20-50 cm., dressées ou ascendantes; feuilles palmatilobées, les supérieures à lobes plus profonds, presque aigus; fleurs d'un blanc bleuâtre, petites, en fascicules axillaires; *calicule à folioles larges, ovales-lancéolées*, naissant assez loin du pédicelle, égalant à peu près le calice; calice peu accrescent, à lobes triangulaires, ne cachant pas les carpelles; *corolle 1-2 fois plus longue que le calice*, à onglets barbus; *carpelles glabres ou pubérulents, fortement creusés-réticulés, à bords non dentés, jaunâtres à la maturité*.

Bords des chemins, décombres, dans le Midi et l'Ouest, jusqu'aux Côtes-du-Nord et même à la Seine-Inférieure; Corse. — Région méditerranéenne de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. = Mai-juillet.