

623. — *Lavatera trimestris* L. — Plante annuelle, peu hérissée; tiges de 30-60 cm., dressées ou ascendantes; feuilles inférieures suborbiculaires, les supérieures anguleuses ou lobées; fleurs d'un rose vif, veinées, grandes, solitaires à l'aisselle des feuilles; calicule accrescent, à lobes ovales, étalés, plus courts que le calice à lobes oblongs-lancéolés; corolle 4-5 fois plus longue que le calice; carpelles nombreux, glabres, *fortement ridés, arrondis sur le dos*, noircissant à la maturité; *axe central à disque orbiculaire concave recouvrant complètement les carpelles*.

Champs cultivés du littoral de la Provence et du Roussillon; Corse. — Région méditerranéenne de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. = Avril-juillet.



Lavatera trimestris.

624. — *L. olbia* L. — Plante ligneuse, dépassant 1 mètre, à rameaux rougeâtres; feuilles tomenteuses, en cœur à la base, à 3-5 lobes, les supérieures hastées; fleurs rouges, grandes, très brièvement pédonculées, solitaires à l'aisselle des feuilles; calicule peu accrescent, à lobes largement ovales, brièvement acuminés, égalant presque le calice à lobes ovales-acuminés; corolle 3 fois plus longue que le calice; carpelles tomenteux, lisses, *plans sur le dos, à bords obtus*, jaunâtres à la maturité; *axe central hémisphérique, saillant*.

Lieux incultes de la région méditerranéenne: Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône; Aude et Pyrénées-Orientales; Corse. — Italie, Sicile, Sardaigne; Espagne et Portugal; Maroc, Algérie, Tunisie. = Mai-juin.



Lavatera olbia.

625. — *L. maritima* Gouan. — Plante ligneuse, d'environ 1 mètre, couverte de poils étoilés; feuilles blanches-tomenteuses, suborbiculaires, les supérieures anguleuses; fleurs d'un blanc rosé, pourpres à l'onglet, à pédoncules plus longs que le pétiole, solitaires ou gémées à l'aisselle des feuilles; calicule non accrescent, à lobes lancéolés, plus courts que le calice très accrescent à lobes ovales-acuminés; corolle 2-3 fois plus longue que le calice; carpelles glabres, *ridés, plans sur le dos, à bords aigus et ondulés*, noircissant à la maturité; *axe central conique*.

Rochers du littoral méditerranéen: Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales; Corse. — Espagne, Baléares, Sardaigne, Italie; Tunisie, Algérie, Maroc. = Février-mai.



Lavatera maritima.

Genre 117. — *ALTHEA* L. — Guimauve.

(Du grec *altaia*, guérison: allusion aux propriétés médicinales de la Guimauve.)

Calicule naissant du pédoncule, à 6-9 divisions soudées inférieurement et simulant un involucre à 6-9 lobes; stigmates sétacés; fruit orbiculaire, déprimé au centre, composé de nombreux carpelles monospermes, rangés en cercle autour d'un axe central.

Fleurs rouges, roses ou lilacées, axillaires et terminales; feuilles palmatilobées ou palmatiséquées; plantes herbacées.

Environ 15 espèces habitant les régions tempérées de l'ancien monde.

TABLEAU DES ESPÈCES

Feuilles superficiellement lobées; pédoncules plus courts que les feuilles; calice à lobes appliqués sur le fruit; carpelles velus.