

Plante verte, mollement velue; fleurs d'un rose vif, très grandes, en longue grappe nue au sommet; carpelles canaliculés sur le dos, à bords ailés-membraneux.

A. pallida 626

Plante toute veloutée-blanchâtre; fleurs d'un blanc rosé, assez grandes, axillaires et terminales; carpelles ni canaliculés, ni ailés, à bords obtus.

A. officinalis 627

Feuilles palmatipartites ou palmatiséquées, au moins les supérieures; pédoncules plus longs que les feuilles; calice à lobes dressés sur le fruit; carpelles glabres.

Plante vivace, dépassant 1 mètre, à pubescence étoilée; feuilles inférieures palmatipartites; corolle rose, 2-3 fois plus longue que le calice; carpelles à dos plan.

A. cannabina 628

Plante annuelle, de 10-40 cm., à longs poils étalés; feuilles inférieures orbiculaires-crénelées; corolle lilacée, puis bleuâtre, dépassant peu le calice; carpelles à dos arrondi.

A. hirsuta 629



Althaea pallida.

626. — *Althaea pallida* W. et Kit. — Plante bis-annuelle ou vivace, hispide, à poils étoilés; tige de 1 à 2 mètres, simple, robuste; feuilles vertes, mollement velues, suborbiculaires, superficiellement lobées, les florales ovales-lancéolées; fleurs d'un rose vif, très grandes, subsessiles, en longue grappe lâche, feuillée à la base, nue au sommet; calicule et calice à peu près égaux, à lobes triangulaires-aigus, striés; corolle 2-3 fois plus longue que le calice, à pétales bilobés; carpelles subbiloculaires, ridés, velus et canaliculés sur le dos, à bords ailés-membraneux.

Bois et bords des champs, dans plusieurs localités du Var. — Europe méridionale, de la Provence à la Grèce et à la Russie; Bithynie. = Juin-août.



Althaea officinalis

627. — *A. officinalis* L. Guimauve officinale. — Plante vivace, toute veloutée-blanchâtre, à racine épaisse, blanche; tiges d'environ 1 mètre, dressées, robustes; feuilles tomenteuses, ovales, à 3-5 lobes peu profonds, inégalement dentés; fleurs d'un blanc rosé, assez grandes, fasciculés sur des pédoncules plus courts que le pétiole; calicule à lobes étroits, lancéolés, plus courts que le calice; calice à lobes ovales-acuminés, appliqués sur le fruit; corolle 2 fois plus longue que le calice, à pétales émarginés; carpelles tomenteux, à bords obtus.

Bord des eaux, surtout dans la région maritime, dans presque toute la France. — Europe centrale et méridionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Juin-septembre. — Plante émolliente, souvent cultivée.



Althaea cannabina.

628. — *A. cannabina* L. — Plante vivace, dépassant 1 mètre, dressée, à pubescence étoilée et un peu rude; feuilles vertes, les inférieures palmatipartites, les autres palmatiséquées et triséquées, à segments lancéolés; fleurs roses, axillaires, solitaires ou géminées sur des pédoncules 1-2 fois plus longs que la feuille; calicule à lobes étroits, lancéolés, plus courts que le calice; calice à lobes ovales-acuminés, dressés sur le fruit; corolle 2 fois plus longue que le calice; carpelles glabres, ridés, plans sur le dos, à bords obtus.

Varie à lobes du calicule ovales-aigus, feuilles mollement tomenteuses et moins découpées (*A. NARBONENSIS* Pourr.).

Haies, bords des fossés, dans le Midi et l'Ouest, jusqu'à l'Isère, l'Allier, la Vendée, le Maine-et-Loire. — Europe méridionale; Asie occidentale. = Juin-septembre.