

642. — *Geranium argenteum* L. — Plante vivace, tomenteuse, d'un blanc argenté, à souche épaisse en fuseau; tiges presque nulles; feuilles la plupart radicales, orbiculaires, palmatiséquées, à 5-7 segments trifides, à lobes divariqués; stipules lancéolées; fleurs d'un rose pâle, grandes; pédoncules biflores, plus longs que la feuille; sépales étalés, assez brusquement mucronés, tomenteux; pétales échancrés, 1-2 fois plus longs que le calice, longuement atténus en coin à la base, à onglet court et cilié; filets des étamines ciliés inférieurement; carpelles soyeux, munis d'une ride transversale au sommet, à arêtes à la fin tordues en spirale.

Fentes des rochers élevés, dans les Hautes-Alpes et les Basses-Alpes. — Italie; Frioul; Tyrol; Carniole; Carinthie. = Juin-juillet.

643. — *G. cinereum* Cav. — Plante vivace, pubescente, d'un vert cendré, à souche épaisse, verticale; tiges presque nulles; feuilles la plupart radicales, orbiculaires, palmatipartites, à segments bi-trilobés, à lobes non divariqués; stipules lancéolées; fleurs rougeâtres, veinées, grandes; pédoncules biflores, plus longs que la feuille; sépales étalés, mucronés, pubescents; pétales échancrés, 1-2 fois plus longs que le calice, obovales, non longuement atténus en coin à la base, à onglet très court et cilié; filets des étamines ciliés inférieurement; carpelles pubescents, munis d'une ride transversale au sommet, à arêtes à la fin tordues en spirale.

Pelouses et rochers élevés, dans les Pyrénées centrales et occidentales. — Espagne septentrionale; Italie centrale et méridionale. = Juin-août.

644. — *G. sanguineum* L. — Plante vivace, hérissée de longs poils étalés, à souche épaisse, horizontale; tiges de 10-40 cm., dressées ou étalées; feuilles orbiculaires, très profondément palmatipartites, à 5-7 segments en coin, trifides, à lobes entiers ou incisés; stipules ovales-aiguës; fleurs rouges, veinées, très grandes; pédoncules uniflores, 1-2 fois plus longs que la feuille; sépales étalés, aristés, parsemés de poils étalés; pétales échancrés, 1-2 fois plus longs que le calice, à onglet très court et cilié; filets des étamines ciliés inférieurement; carpelles poilus au sommet, non ridés.

Coteaux et bois secs, dans presque toute la France. — Europe, jusqu'à la région boréale; Asie occidentale. = Juin-juillet.

645. — *G. pyrenaicum* L. — Plante vivace, mollement pubescente, à souche grêle, courte, verticale; tiges de 30-60 cm., dressées ou étalées; feuilles orbiculaires, palmatifides, à 5-7 lobes élargis, en coin, incisés-crénélés; stipules oblongues-lancéolées; fleurs d'un violet bleuâtre, assez grandes, en panicule; pédoncules biflores, plus longs que la feuille; sépales étalés, à peine mucronés, pubescents-glanduleux; pétales profondément échancrés, 1-2 fois plus longs que le calice, à onglet court et cilié; filets des étamines ciliés inférieurement; carpelles finement pubescents, non ridés.

Prés, chemins, champs, dans presque toute la France; rare dans le Midi et surtout dans l'Ouest. — Europe centrale et méridionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Mai-septembre.




Geranium argenteum



Geranium cinereum.



Geranium sanguineum.



Geranium pyrenaicum.