



Geranium tuberosum.



Geranium pratense.



Geranium silvaticum.



Geranium rivulare

646. — Geranium tuberosum L. — Plante vivace, finement pubescente, à souche tubéreuse, subglobuleuse; tiges de 20-40 cm., dressées, grêles, nues jusqu'aux bifurcations; feuilles polygonales-suborbiculaires, palmatiséquées, à 5-7 segments lancéolés, pennatifidis, à lobes entiers ou dentés; fleurs d'un rouge violet, assez grandes, en corymbe; pédoncules uni-biflores. bien plus longs que la feuille; pédicelles fructifères dressés; sépales étalés, mucronés, poilus; pétales échancrés en cœur, 1-2 fois plus longs que le calice, à onglet court et cilié; filets des étamines ciliés inférieurement; carpelles velus, non ridés.

Champs, vignes, prairies, dans les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, l'Hérault; la Vienne. — Europe méditerranéenne; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Avril-juin.

647. — G. pratense L. — Plante vivace, pubescente, glanduleuse au sommet, à souche épaisse, oblique; tiges de 30-80 cm., dressées, robustes; feuilles polygonales, palmatifidis, à 5-7 segments larges, incisés-dentés; stipules lancéolées; fleurs d'un bleu purpurin, grandes, en cymes corymbiformes; pédoncules biflores, plus longs que la feuille; pédicelles réfractés après la floraison; sépales étalés, aristés; pétales larges, obovales, entiers, 1-2 fois plus longs que le calice, à onglet court et cilié; filets des étamines à base large, triangulaire, ciliée; anthères elliptiques; carpelles velus-glanduleux, non ridés.

Prairies des montagnes: Vosges; Jura; Basses-Alpes; Cévennes; Pyrénées. — Presque toute l'Europe; Caucase, Sibérie, Daourie. = Juin-août.

648. — G. silvaticum L. — Plante vivace, pubescente, glanduleuse au sommet, à souche épaisse, oblique; tiges de 30-80 cm., dressées, robustes; feuilles polygonales, palmatifidis, à 5-7 segments élargis et rapprochés, incisés-dentés; stipules lancéolées; fleurs d'un rose violet, grandes, en cymes corymbiformes; pédoncules biflores, plus longs que la feuille; pédicelles dressés après la floraison; sépales étalés, aristés; pétales entiers, obovales, 1-2 fois plus longs que le calice, à onglet court et cilié; filets des étamines lancéolés en alène, ciliés à la base; anthères elliptiques; carpelles velus-glanduleux.

Près et bois des montagnes siliceuses: Vosges; Jura; Alpes; Cévennes et Plateau central; Corbières et Pyrénées; çà et là dans le Nord. — Presque toute l'Europe; Asie occidentale. = Juin-août.

649. — G. rivulare Vill. (G. aconitifolium L'Herit.). — Voisin du précédent. Plante vivace, pubescente, non glanduleuse au sommet; tiges de 15-40 cm., grêles, ascendantes; feuilles palmatiséquées, à segments étroits, écartés, profondément incisés; fleurs blanches rayées de pourpre, assez grandes, en cymes corymbiformes; pédoncules biflores; pédicelles dressés après la floraison; sépales aristés; pétales entiers, obovales, 1 fois plus longs que le calice; filets des étamines lancéolés en alène; anthères ovales; carpelles pubescents, non glanduleux.

Ruisseaux et prairies humides des hautes montagnes: Alpes du Dauphiné, de la Savoie, de la Provence. — Suisse; Italie septentrionale; Tyrol. = Juillet-août.