

661.— *Erodium ciconium* Willd.—Plante annuelle, pubescente-glanduleuse, caulescente, de 10-60 cm.; feuilles ovales ou oblongues, pennatiséquées, à segments obtus, pennatifides, les supérieurs décurrents sur le pétiole; fleurs d'un bleu clair, veinées, 2-7 sur des pédoncules axillaires plus longs que la feuille; pédicelles 1-2 fois plus longs que le calice; bractéoles petites, ovales-acuminées, non soudées; sépales aristés, à 3-5 nervures saillantes; pétales dépassant à peine le calice, inégaux, les 2 plus grands échancrés; valves du fruit sans pli concentrique; bec long de 6-8 cm.; arêtes à 6-8 tours de spire.

Sables, chemins, talus, dans tout le Midi, jusque dans les Hautes-Alpes, la Savoie, le Rhône, l'Ardèche, l'Aveyron, le Puy-de-Dôme; Corse. — Europe méridionale; l'Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Avril-juillet.

662. — *E. Manescavi* Coss. — Plante vivace, velue-glanduleuse, acaule, de 10-50 cm.; souche ligneuse, courte, simple; feuilles toutes radicales, pennatiséquées, à segments écartés, ovales, incisés-dentés; fleurs d'un rouge violacé, grandes, 2-15 en ombelles sur de longs pédoncules radicaux; bractéoles herbacées, soudées en involucre à dents aiguës; sépales longuement aristés, velus-glanduleux; pétales 1-2 fois plus longs que le calice, ovales, égaux, entiers; bec long de 6-7 cm.; arêtes à 6-8 tours de spire.

Prairies et pâturages des Pyrénées occidentales et centrales: Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées. — Pyrénées espagnoles. = Juillet-août.

663. — *E. macradenum* L'Hérit. — Plante vivace, velue-glanduleuse, acaule, de 5-15 cm., à odeur forte; souche ligneuse, grosse, longue, écailleuse; feuilles toutes radicales, longuement pétiolées, ovales, bipennatiséquées, à lobes linéaires ou linéaires-lancéolés; fleurs violacées, grandes, 2-4 sur de longs pédoncules radicaux; bractéoles grandes, ovales-aiguës; sépales longuement aristés; pétales 1 fois plus longs que le calice, non contigus, brièvement acuminés, inégaux, les 2 plus grands tachés de noir; bec de 2 cm. environ; arêtes munies en dedans de poils jaunes non articulés.

Rochers schisteux des Pyrénées orientales et centrales: Pyrénées-Orientales, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées. — Andorre et Espagne septentrionale. = Juin-août.

664. — *E. petræum* Willd. — Plante vivace, velue-glanduleuse, acaule, de 5-15 cm., à odeur forte; souche ligneuse, grosse, longue, écailleuse; feuilles toutes radicales, ovales, bipennatiséquées, à lobes linéaires ou linéaires-lancéolés; fleurs rouges, veinées, grandes, 2-4 sur des pédoncules radicaux; bractéoles petites, lancéolées-acuminées; sépales brièvement mucronés; pétales 1 fois plus longs que le calice, largement obovales, contigus, égaux, non maculés; bec de 2 cm. environ; arêtes munies de poils blancs articulés.

Varie à fleurs blanches ou rosées, feuilles à lobes plus larges, glabrescents et luisants (*E. lucidum* Lap.) ou velus-cendrés et crépus (*E. crispum* Lap.).

Rochers et coteaux pierreux du Languedoc et des Pyrénées: Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, Ariège, Haute-Garonne. — Espagne. = Avril-juillet.



Erodium ciconium.



Erodium Manescavi.



Erodium macradenum.



Erodium petræum.