

689. — *Acer Pseudoplatanus* L. *Sycomore*. — Arbre élevé, à écorce lisse; feuilles grandes, vertes et glabres en dessus, mates et pubescentes-blanchâtres en dessous, un peu en cœur à la base, à 5 lobes ovales à peine acuminés, fortement et inégalement dentés, séparés profondément par des sinus très aigus; fleurs verdâtres, paraissant après les premières feuilles, en grappes fournies, allongées, pendantes; pédicelles, sépales, pétales, filets des étamines et ovaires velus; samares glabres, à coques convexes, bossues-anguleuses, nervées, à ailes dressées-étalées, rétrécies à la base.

Bois des montagnes, dans presque toute la France et en Corse. Très souvent planté. — Europe, surtout centrale; Caucase et Arménie. = Fl. mai, fr. septembre.



*Acer Pseudoplatanus.*

690. — *A. platanoides* L. *Érable plane*. — Arbre élevé, à écorce lisse; feuilles grandes, minces, glabres, vertes et luisantes en dessous, un peu en cœur à la base, à 5-7 lobes sinués-dentés, acuminés et très aigus, séparés par des sinus arrondis très ouverts; fleurs d'un jaune verdâtre, paraissant avec les premières feuilles, en corymbes dressés, rameux, presque sessiles; pédicelles, sépales, pétales, filets des étamines glabres; samares glabres, à coques fortement comprimées, planes, lisses, à ailes étalées presque horizontalement, non rétrécies à la base.

Bois des montagnes, çà et là, dans presque toute la France. Souvent planté. — Presque toute l'Europe; Caucase. = Fl. avril-mai, fr. septembre.



*Acer platanoides*

691. — *A. monspessulanum* L. *Érable de Montpellier*. — Arbre ou arbuste atteignant au plus 5-6 mètres, à écorce fendillée; feuilles petites, coriaces, glabres, vertes et luisantes en dessus, mates et glauques en dessous, à peine en cœur à la base, à 3 lobes triangulaires obtus, presque égaux et entiers, séparés par des sinus formant presque un angle droit; fleurs d'un jaune verdâtre, paraissant avant ou avec les premières feuilles, en corymbes à la fin penchés, sessiles; pétales et filets des étamines glabres; samares glabres, petites, à coques très convexes, veinées, à ailes dressées-convergentes, rétrécies à la base.

Coteaux secs du Midi, jusqu'à la Côte-d'Or, l'Allier, la Vendée; Corse. — Europe méridionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Fl. avril, fr. septembre.



*Acer monspessulanum.*

692. — *A. opulifolium* Vill. (*A. OPALUS* Mill.). — Arbre élevé, à écorce lisse; feuilles assez grandes, coriaces, vertes et glabres en dessus, mates, glauques-blanchâtres et souvent poilues en dessous, en cœur à la base, à 5-7 lobes courts et larges, lâchement dentés, obtus ou à peine acuminés, séparés par des sinus peu profonds, ouverts, presque droits; fleurs d'un jaune verdâtre, paraissant avant les feuilles, en corymbes penchés, lâches, subsessiles; sépales, pétales, filets des étamines glabres; samares glabres, à coques très renflées, bossues, lisses, à ailes dressées-étalées, divergentes, non rétrécies à la base.

Bois des montagnes, surtout calcaires, du Midi et de l'Est: Jura; Alpes; Cévennes; Pyrénées; Corse. — Europe méridionale; Caucase, l'Erse; Algérie. = Fl. mars-avril, fr. septembre.



*Acer opulifolium.*