



Ruta corsica.

706. — Ruta corsica DC. — Plante de 10-50 cm., glabre, glaucescente, non glanduleuse dans le haut, à liges flexueuses; feuilles triangulaires dans leur pourtour, toutes pétiolées, à folioles obovales, celles des feuilles inférieures pétiolulées; fleurs d'un jaune très pâle ou blanchâtre, petites; bractées et sépales ovales-obtus; *pétales largement ovales, ondulés, non ciliés*; grappe fructifère allongée, très lâche, flexueuse en zig-zag, à pédicelles 2-4 fois plus longs que la capsule, devenant spinescents après la chute du fruit; *capsule subglobuleuse, à 4 lobes acuminés-dressés*.

Rochers des montagnes siliceuses de la Corse. — Sardaigne — Plante spéciale à ces îles. = Juillet-août.

Genre 132. — DICTAMNUS L. — Dictame.

(Du grec *Dictamnus*, dérivé de *Dictos*, montagne de Crète.)

Une seule espèce.



Dictamnus albus.

707. — Dictamnus albus L. Fraxinelle. — Plante de 40-80 cm., très feuillée au milieu, couverte de poils glanduleux; feuilles imparipennées, à folioles grandes, ovales, denticulées, sessiles; fleurs irrégulières, blanches ou roses veinées de violet, grandes, en longue grappe pubescente-glanduleuse; calice caduc, à 5 sépales inégaux; 5 pétales inégaux, plans, entiers, 3-4 fois plus longs que le calice, les 4 supérieurs ascendants, l'inférieur réfléchi; 10 étamines, dirigées en bas, plus longues que les pétales; ovaire stipité; *capsule à 5 lobes profonds, cuspidés, ridés sur les faces*.

Coteaux calcaires de l'Est et du Midi, de l'Alsace aux Alpes-Maritimes et aux Pyrénées-Orientales. — Europe centrale et méridionale; Asie occidentale jusqu'à l'Himalaya. = Mai-juillet. — Souvent cultivée comme ornement, la Fraxinelle répand au temps des chaleurs une vapeur inflammable. Sa racine, amère et aromatique, a été employée comme vermifuge et diurétique.

FAMILLE 28. — CORIARIÉES.

Dessin de M. DENISE.

Un seul genre et 4 ou 5 espèces habitant la région méditerranéenne, l'Asie orientale, l'Océanie.

Genre 133. — CORIARIA L. — Corroyère.

(Du latin *corium*, cuir : arbrisseau souvent employé dans la tannerie.)



Coriaria myrtifolia

708. — Coriaria myrtifolia L. Redoux. — Arbrisseau de 2-3 mètres, glabre, à rameaux tétragones, grisâtres; feuilles opposées ou verticillées, ovales-lancéolées, entières, à 3 nervures, presque sessiles; fleurs régulières, polygames, verdâtres, petites, en grappes dressées, axillaires et terminales; calice accrescent, devenant charnu, ainsi que la corolle, à 5 sépales ovales; 5 pétales, alternes avec les sépales, plus courts qu'eux; 10 étamines; 5 styles, longs, filiformes, saillants, rougeâtres; fruit bacciforme, à la fin noir et luisant, à 5 carpelles étalés en étoile, indéhiscents et à 1 seule graine.

Coteaux et bois secs, dans toute la région méditerranéenne et le Sud-Ouest, jusqu'à la Gironde, le Lot et l'Aveyron. — Italie; Espagne et Portugal; Maroc et Algérie. = Avril-juillet. — Plante très astringente, employée dans la tannerie et la teinture; fruits vénéneux.