

FAMILLE 30. — STAPHYLÉACÉES.

Dessin de M. DENISE.

16 espèces répandues dans l'Europe, l'Asie, l'Amérique.

Genre 135. — STAPHYLEA L. — *Staphylier*.(Du grec *staphylé*, grappe : allusion à la disposition des fleurs.)

4 espèces habitant l'Europe, l'Asie, l'Amérique boréale.



Staphylea pinnata.

✓ 711. — *Staphylea pinnata* L. *Faux-Pistachier*, *Nez-coupé*. — Arbrisseau de 2 à 5 mètres, glabre, à écorce lisse; feuilles opposées, longuement pétiolées, imparipennées, à 5-7 folioles ovales-lancéolées, acuminées, finement dentelées, à stipules membraneuses caduques; fleurs régulières, d'un blanc rosé, en grappes longuement pédonculées, pendantes; calice caduc, à 5 lobes; 5 pétales, alternes avec les sépales, insérés sur un disque, égalant le calice et les étamines; 5 étamines, alternes avec les pétales; 2-3 styles à stigmates simples; ovaire libre; capsule grande, membraneuse, renflée en vessie, à 2-3 lobes apiculés, s'ouvrant par le bord interne, renfermant chacun 1 graine globuleuse, ligneuse, brune, luisante, plus grosse qu'un pois.

Bois en Alsace et dans le Jura septentrional aux environs de Montbéliard. Fréquemment planté dans les jardins et les parcs. — Europe centrale et orientale; Asie occidentale. = Fl. mai, fr. août. — Les graines servent à faire des grains de chapelet; douces au goût, mais âcres, elles sont oléagineuses.

FAMILLE 31. — ILICINÉES.

Dessin de M. DENISE.

Environ 180 espèces répandues dans presque tout le globe.

Genre 136. — ILEX L. — *Houx*.(Du celtique *ac*, pointe : allusion aux feuilles épineuses.)

Environ 175 espèces habitant presque toutes les régions du globe.



Ilex Aquifolium.

✕ 712. — *Ilex Aquifolium* L. *Houx commun*. — Arbuste ou petit arbre de 2 à 10 mètres, glabre, vert; feuilles alternes, courtement pétiolées, persistantes, très coriaces, luisantes, ovales ou elliptiques, aiguës, ondulées et dentées-épineuses, entières à 1 seule épine terminale sur les vieux pieds; pas de stipules; fleurs régulières, blanches ou un peu rosées, petites, en fascicules axillaires, brièvement pédonculées; calice persistant, à 4-5 lobes petits; corolle en roue, à 4-5 pétales soudés à la base entre eux et avec les filets des étamines; 4-5 étamines, alternes avec les pétales; style très court, 4-5 stigmates presque sessiles; fruit drupacé, charnu, globuleux, plus gros qu'un pois, rouge, luisant, persistant, à 4-5 noyaux triangulaires.

Haies et bois, dans presque toute la France et en Corse; rare dans la région méditerranéenne. — Europe; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Fl. mai-juin, fr. septembre-octobre. — Le bois est très estimé des ébénistes; la seconde écorce sert à préparer la glue des oisculateurs. Les racines sont émollientes et résolutive, et les fruits violemment purgatifs.