

## TABLEAU DES ESPÈCES

- Feuilles paraissant opposées sur les jeunes rameaux opposés, fasciculées sur les anciens terminés en épines; fleurs à 4 divisions.
- Rameaux anciens terminés par une seule épine; feuilles assez grandes, à pétiole égalant la moitié du limbe et 2-3 fois plus long que les stipules; arbuste de 2 à 4 mètres. . . . . **R. cathartica** 714
- Rameaux portant plusieurs épines; feuilles assez petites, à pétiole égalant au plus le tiers du limbe; arbrisseaux de 50 cm. à 1 mètre.
- Feuilles à pétiole égalant environ le tiers du limbe; stipules plus courtes que le pétiole; rameaux d'un brun rougeâtre; graines à sillon dorsal fermé. . . . . **R. infectoria** 715
- Feuilles à pétiole court, égalant seulement le cinquième du limbe; stipules égalant ou dépassant le pétiole sur les jeunes rameaux d'un blanc grisâtre; graines à sillon dorsal très ouvert. . . . . **R. saxatilis** 716
- Feuilles toutes alternes; rameaux alternes, jamais épineux; fleurs à 4-5 divisions.
- Calice à 4 divisions; 4 étamines; feuilles finement crénelées-dentées.
- Feuilles munies de chaque côté de la nervure médiane de 5-7 nervures arquées; calice à lobes lancéolés-acuminés, plus longs que le tube; sous-arbrisseau couché de 5-20 cm. . . . . **R. pumila** 717
- Feuilles munies de chaque côté de la nervure médiane de 10-15 nervures droites; calice à lobes triangulaires, égalant le tube; arbrisseau dressé de 1 à 3 mètres. . . . . **R. alpina** 718
- Calice à 5 divisions; 5 étamines; feuilles entières ou à dents écartées.
- Feuilles caduques, entières, munies de chaque côté de la nervure médiane de 8-12 nervures saillantes; 5 pétales; 1 style, à stigmate en tête. . . . . **R. Frangula** 719
- Feuilles persistantes, coriaces, souvent dentées, à 4-6 nervures peu saillantes de chaque côté de la nervure médiane; pétales nuls; style bi-trifide. . . . . **R. Alaternus** 720



Rhamnus cathartica.



Rhamnus infectoria.

**714.** — *Rhamnus cathartica* L. *Noirprun*. — Arbrisseau de 2-4 mètres, à rameaux opposés, épineux, d'un brun noirâtre, les jeunes pubescents; feuilles caduques, fasciculées sur les anciens rameaux, subopposées sur les jeunes, larges de 2-3 cm., ovales ou elliptiques, denticulées, munies de chaque côté de la nervure médiane de 3-4 nervures convergentes, saillantes; *pétiole égalant la moitié du limbe et 2-3 fois plus long que les stipules*; fleurs dioïques, jaunâtres, en faisceaux bien fournis; *calice à 4 lobes lancéolés, égalant le tube*; 4 pétales; graines à sillon dorsal fermé.

Varie à rameaux inermes, feuilles plus grandes et entièrement glabres (*R. hydriensis* Hacq.; *R. silvaticus* Serres).

Haies et bois, dans presque toute la France; rare dans le Midi. — Europe; Asie occidentale, jusque dans l'Afghanistan; Algérie. = Fl. mai-juin, fr. août-septembre.

**715.** — *R. infectoria* L. *Nerprun des teinturiers*. — Arbrisseau de 50 cm. à 1 m., à rameaux opposés, très épineux, d'un brun rougeâtre, les jeunes pubescents; feuilles caduques, fasciculées sur les anciens rameaux, subopposées sur les jeunes, petites, de 1 à 2 cm. de large, ovales ou elliptiques, denticulées, munies de chaque côté de 3-4 nervures convergentes, médiocrement saillantes; *pétiole égalant environ le tiers du limbe*; *stipules plus courtes que le pétiole*; fleurs dioïques, jaunâtres, en faisceaux peu fournis; *calice à 4 lobes lancéolés, bien plus longs que le tube*; 4 pétales; style bipartit; *graines à sillon dorsal fermé*.

Rochers et lieux arides du Midi: Provence, Languedoc, Roussillon; Drôme, Aveyron, Charente. — Espagne; Italie septentrionale. = Fl. avril-mai, fr. août-septembre.