

**Rhamnus Alaternus.**

720. — *Rhamnus Alaternus* L. *Alaterne*. — Arbrisseau de 1 à 5 mètres ou sous-arbrisseau peu élevé, à rameaux alternes, non épineux, glabres; feuilles persistantes, coriaces, alternes, ovales ou lancéolées, à bords cartilagineux lâchement dentés, munies de chaque côté de la nervure médiane de 4-6 nervures peu saillantes; fleurs dioïques, jaunâtres, en petites grappes multiflores bractéolées; calice à 5 lobes lancéolés, réfléchis dans les fleurs mâles, dressés dans les fleurs femelles; pétales nuls; style bi-trifide; graines à sillon dorsal ouvert. Plante polymorphe.

Rochers et coteaux calcaires du Midi et de l'Ouest, jusque dans l'Isère, l'Ardèche, l'Aveyron, le Lot, la Vienne et le Maine-et-Loire; Corse. — Europe méridionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Fl. mars-avril, fr. octobre-novembre.

FAMILLE 33. — TÉRÉBINTHACÉES.

Dessins de M. DENISE.

Fleurs régulières; calice à 3-5 divisions; pétales nuls ou 3-5, insérés sur les bords d'un disque hypogyne, alternes avec les sépales; 3-5 étamines, alternes avec les pétales et insérées avec eux; 3-4 styles ou stigmates; ovaire libre; fruit sec ou un peu charnu, à 1-3 noyaux et à 1-6 graines.

Arbrisseaux à suc résineux ou gommeux; feuilles alternes, simples ou composées, sans stipules; fleurs jaunes, verdâtres ou brunâtres, petites, ordinairement en panicule.

Environ 430 espèces répandues dans les régions chaudes et tropicales, rarement tempérées, des deux mondes.

TABLEAU DES GENRES

Fleurs à 3-4 pétales; 3-4 étamines; fruit à 2-3 noyaux; feuilles oblongues, entières, persistantes. **CNEORUM 139**

Fleurs à pétales nuls ou 5; 5 étamines; fruit à 1 seul noyau; feuilles tout autres.


Fleurs brunâtres, sans pétales; étamines insérées au fond du calice; feuilles pennées, à folioles entières et glabres. **PISTACIA 140**

Fleurs verdâtres ou jaunâtres, à 5 pétales; étamines insérées au-dessous du disque; feuilles simples et glabres, ou pennées à folioles dentées et velues.

RHUS 141

Genre 139. — **CNEORUM** L. — *Camélée*.

2 espèces habitant la région méditerranéenne et les îles Canaries.

**Cneorum tricoccum.**

721. — *Cneorum tricoccum* L. — Sous-arbrisseau de 30-80 cm., dressé, vert, glabre; feuilles rapprochées, entières, oblongues, coriaces, persistantes, luisantes, sessiles et atténuées à la base, à 1 nervure; fleurs hermaphrodites, jaunes, brièvement pédonculées, 1-3 à l'aisselle des feuilles supérieures; calice persistant, à 3-4 lobes ovales-obtus; 3-4 pétales, insérés au-dessous du disque, bien plus longs que le calice; 3-4 étamines; 1 style court, à 3-4 stigmates, persistant sur le fruit; fruit sec, drupacé, d'un vert noir à la maturité, à 3 coques globuleuses, se séparant aisément et contenant chacune deux graines.

Lieux arides, surtout calcaires, de la région méditerranéenne, dans la Provence, le Languedoc, le Roussillon. — Espagne, Baléares, Sardaigne, Italie. = Avril-juin. — Plante à suc très âcre et violent purgatif.