



Cercis Siliquastrum

- X 741. — **Cercis Siliquastrum** L. *Arbre de Judée*. — Arbre de 3-6 mètres, à rameaux flexueux; feuilles caduques, simples, orbiculaires, échancrées en cœur à la base, palmatinervées, glabres; stipules très caduques; fleurs roses, pédicellées, en petites grappes dressées, paraissant avant les feuilles à travers l'écorce des branches et des rameaux; calice caduc, à 5 dents courtes et obtuses; étendard plus court que les autres pétales; 10 étamines, libres; style en alène, stigmaté en tête; gousse pendante, longue de 7-10 cm. sur 15 mm., très comprimée, sèche, glabre, d'un brun rougeâtre, à 10-14 graines ovoïdes, noires.

Coteaux secs et boisés du Midi: Drôme, Vaucluse, Ardèche, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales. — Tyrol, Istrie, Dalmatie, Grèce, Turquie; Asie occidentale. = Mars-mai. Souvent cultivé comme arbre d'ornement.

### Genre 149. — CERATONIA L. — Caroubier.

(Du grec *ceras*, corne: allusion à la forme et à la consistance de la gousse.)

1 seule espèce.



Ceratonia Siliqua

- Y 742. — **Ceratonia Siliqua** L. — Arbre atteignant 3-10 mètres; feuilles persistantes, paripennées, à 3-5 paires de folioles ovales, entières, pennatinervées, coriaces, luisantes en dessus, plus pâles en dessous; stipules très caduques; fleurs verdâtres, très petites, nombreuses, en grappes oblongues, dressées, axillaires, brièvement pédonculées; calice caduc, petit, rouge, à 5 lobes ovales; corolle nulle; 5 étamines libres, opposées aux sépales, étalées, longuement saillantes; stigmaté sessile, en tête; gousse pendante, de 12-20 cm. sur 2, flexueuse, épaisse, coriace, pulpeuse, à 12-16 graines ovoïdes, brunes.

Rochers maritimes de la Provence et de la Corse. — Région méditerranéenne de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique. = Fl. août-octobre. fr. juillet-août de l'année suivante. Les fruits ou caroubes contiennent une pulpe noirâtre sucrée et rafraîchissante. On les emploie pour la nourriture et l'engraissement des bestiaux, et on en retire par la fermentation une liqueur alcoolique.

### Genre 150. — ANAGYRIS L.

(Du grec *anagyros*, arqué en arrière: allusion aux bords ondulés de la gousse.)

2 ou 3 espèces habitant la région méditerranéenne.



Anagyris foetida

743. — **Anagyris foetida** L. *Bois puant*. — Arbrisseau de 1 à 3 mètres, fétide, à jeunes rameaux pubescents-blanchâtres; feuilles caduques, trifoliolées, pétiolées, à folioles sessiles, elliptiques, entières, glabres en dessus, pubescentes en dessous; stipules soudées ensemble; fleurs jaunes tachées de noir, grandes, en grappes latérales courtes, feuillées à la base; calice persistant, en cloche, à 5 dents presque égales; étendard plus court que les autres pétales; 10 étamines, libres; style filiforme, stigmaté en tête; gousse pendante, de 10-18 cm. sur 2, bosselée, ondulée aux bords, glabre, fauve, à 3-8 graines grosses, en rein, violettes.

Garrigues et coteaux arides du Midi: Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault; Corse. — Europe méditerranéenne; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Fl. février-mars, fr. mai. — Feuilles et graines émétiques et purgatives.