


*Genista hispanica**Genista occidentalis**Genista anglica**Genista germanica*

**758. — *Genista hispanica* L.** — Sous-arbrisseau de 10-25 cm., très épineux, rameux, étalé, à épines rameuses, grêles, à peine vulnérantes; jeunes rameaux peu épineux, couverts, ainsi que les feuilles et les calices, de longs poils blancs étalés; feuilles simples, sessiles, les inférieures oblongues-lancéolées; stipules nulles; fleurs terminales, petites, en têtes ombelliformes; pédicelles bractéolés, égalant le tube du calice; calice à lèvres très inégales; étendard glabre, égalant la carène pubescente; gousse petite, de 9-10 mm. sur 5, ovale-rhomboidale, à pointe courbée du côté supérieur, glabre ou un peu hérissée, à 1-2 graines.

Pelouses et rochers calcaires du Midi : Provence, Languedoc, Roussillon; remonte dans les Hautes-Alpes, la Drôme, la Lozère, l'Aveyron. — Italie, dans la Ligurie; Espagne. = Mai-juin.

**759. — *G. occidentalis* Rony (*G. hispanica* var. *villosa* Willk.).** — Voisin du précédent. Arbrisseau dépassant souvent 1 mètre, très épineux, très rameux, dressé, robuste, à épines fortes, vulnérantes; jeunes rameaux épineux, un peu velus, ainsi que les feuilles et les calices, à poils appliqués; feuilles inférieures ovales-oblongues, obtuses, les supérieures largement lancéolées; stipules nulles; fleurs assez grandes, en têtes ombelliformes; calice à lèvres très inégales; gousse assez grosse, ovale-rhomboidale, à pointe courbée du côté supérieur, velue-hérissée, à 2 graines ovoïdes.

Coteaux calcaires des Pyrénées occidentales : Basses-Pyrénées et Hautes-Pyrénées. — Espagne septentrionale. = Juin-juillet.

**760. — *G. anglica* L.** — Sous-arbrisseau de 30 cm. à 1 mètre, épineux, lâche, diffus, glabre; jeunes rameaux étalés, à épines simples, les floraux inermes; feuilles simples, subsessiles, obovales ou lancéolées-aiguës, glabres; stipules nulles; fleurs petites, en grappes terminales courtes, feuillées; pédicelles bractéolés, égalant à peu près le calice; calice glabre, à lèvres inégales; corolle glabre, à étendard un peu plus court que la carène; gousse de 12-15 mm. sur 5, renflée-cylindrique, à pointe courbée du côté supérieur, glabre, à 5-10 graines ovoïdes, noires.

Landes et bruyères des terrains siliceux, surtout dans l'Ouest et le Centre; rare dans l'Est et le Midi. — Europe occidentale, de la Suède au Portugal, jusque dans le Hanovre et l'Italie méridionale. = Avril-juin.

**761. — *G. germanica* L.** — Sous-arbrisseau de 30-60 cm., épineux, dressé, velu; rameaux anciens munis d'épines rameuses, les jeunes inermes, dressés, verts, velus; feuilles simples, subsessiles, lancéolées, luisantes, ciliées; stipules nulles; fleurs petites, en grappes terminales oblongues, non feuillées; pédicelles bractéolés, égalant le tube du calice; calice velu, à lèvres presque égales; corolle pubescente, à étendard bien plus court que la carène; gousse courte de 8-10 mm. sur 5, ovale-rhomboidale, comprimée, à pointe courbée du côté supérieur, velue, à 2-4 graines ovoïdes, brunes.

Bois et buissons dans presque tout l'Est, et çà et là dans le Centre; nul dans le Nord, l'Ouest et le Midi. = Europe centrale, jusqu'au Danemark, à la Russie et à l'Italie centrales. = Mai-juin.