



Genista sagittalis



Genista delphinensis



Genista purgans



Genista prostrata

766. — *Genista sagittalis* L. *Genêt herbacé.* — Sous-arbrisseau de 10-30 cm., non épineux, gazonnant, à tiges couchées-radicantes; *rameaux redressés, allongés, droits, simples, herbacés, comprimés, bordés de 3 ailes foliacées, interrompues à chaque nœud; feuilles simples, écartées, sessiles, ovales ou lancéolées, mollement velues; stipules nulles; fleurs assez grandes (12-13 mm.), nombreuses, en grappes terminales denses; calice velu, à lèvres égales, plus longues que le tube; étendard glabre, égalant la carène; gousse de 15-20 mm. sur 5, comprimée, bosselée, apiculée, velue, à 3-6 graines.*

Coteaux, bois, pelouses. dans presque toute la France; nul en Corse. — Toute l'Europe, excepté la région boréale. = Mai-juillet.

767. — *G. delphinensis* Verlot. — Voisin du précédent; sous-arbrisseau de 10-20 cm., non épineux, à tiges grêles, à peine ligneuses, couchées-radicantes; *rameaux couchés, courts, flexueux en zigzag, divariqués, velus-soyeux, assez étroitement ailés; feuilles peu écartées, ovales-elliptiques, velues-soyeuses; fleurs d'un jaune pâle, petites, réunies par 2-3, les unes terminales, les autres axillaires; calice velu-soyeux, à lèvres égales; étendard pubescent, égalant la carène; gousse linéaire-oblongue, apiculée, velue, à 3-6 graines.*

Rochers et coteaux des montagnes calcaires, dans la Drôme et les Pyrénées-Orientales. Cette espèce n'a pas encore été signalée ailleurs. = Juin-août.

768. — *G. purgans* L. (*SAROTHAMNUS PURGANS* G. G.). — Sous-arbrisseau de 30-60 cm., non épineux, glauque, très rameux; *rameaux rapprochés, subjonciformes, cylindriques, striés, presque nus; feuilles simples, sessiles, oblongues ou lancéolées, pubescentes surtout en dessous, promptement caduques; stipules nulles; fleurs assez petites, odorantes, axillaires, solitaires, formant une grappe courte et nue; calice pubescent, en cloche, à lèvres divariquées, égales, la supérieure simplement bidentée; gousse de 20-25 mm. sur 6-7, oblongue, comprimée, velue, à la fin noire.*

Lieux arides des montagnes siliceuses du Centre et d'I Midi: Pyrénées, Corbières, Cévennes, Auvergne, Vivarais, Forez; alluvions de l'Allier et de la Loire jusqu'en Maine-et-Loire. — Espagne et Portugal; Algérie et Maroc. = Mai-juillet.

769. — *G. prostrata* Lamk. (*G. HALLERI* Reyn.; *CYTISUS DECUMBENS* G. G.). — Sous-arbrisseau de 10-30 cm., non épineux, couché-étalé, velu; *rameaux ascendants, pentagonaux, feuillés jusqu'au sommet; feuilles simples, courtement pétiolées, obovales, poilues en dessous; stipules nulles; fleurs assez grandes, solitaires ou géminées, en longues grappes unilatérales feuillées; pédicelles bractéolés, filiformes, 2-4 fois plus longs que le calice; calice velu, à lèvres divariquées, égales, la supérieure simplement bidentée; étendard glabre, redressé, dépassant à peine la carène; gousse de 24-30 mm. sur 6, velue, à la fin noire.*

Coteaux et pelouses, dans l'Est et le Centre, jusqu'aux environs de Paris, à l'Eure, à la Lozère et à l'Aveyron; Hautes et Basses-Pyrénées. — Europe centrale, de la France à l'Albanie. = Mai-juillet.