

770. — *Genista Villarsii* Clem. (G. PULCHELLA G. G., non Vis.). — Sous-arbrisseau de 10-30 cm., tortueux, couché-étalé, à rameaux anciens spinescents au sommet, les jeunes courts, sillonnés, velus-blanchâtres; feuilles simples, linéaires-lancéolées, velues sur les deux faces; stipules nulles; fleurs solitaires, en grappes très courtes et feuillées; calice velu, à lèvres égales, égalant le tube, l'inférieure à dents latérales écartées; étendard velu-soyeux, égalant la carène; ailes et carène à la fin déjetées-pendantes; gousse de 12-15 mm. sur 5-6, bosselée, velue, à 2-4 graines.

Montagnes arides et calcaires du Midi : Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Var, Vaucluse, Drôme, Aveyron, Aude. — Dalmatie, Herzégovine, Monténégro. = Juin-juillet.



Genista Villarsii

771. — *G. pilosa* L. — Sous-arbrisseau de 20-50 cm., couché à la base, rarement plus élevé et dressé; rameaux non spinescents, fortement striés, velus-soyeux; feuilles simples, elliptiques-oblongues, pubescentes-soyeuses en dessous, munies de 2 petites stipules; fleurs solitaires ou géminées, en longues grappes unilatérales feuillées; calice velu, à lèvres égales, égalant le tube, l'inférieure à dents rapprochées; étendard velu-soyeux, un peu plus long que la carène; ailes et carène à la fin déjetées-pendantes; gousse de 20-25 mm. sur 4, comprimée, bosselée, velue, à 3-7 graines.

Landes, bruyères, coteaux, surtout siliceux, dans presque toute la France. — Europe, surtout occidentale et centrale. = Avril-juillet.



Genista pilosa

772. — *G. cinerea* DC. — Sous-arbrisseau de 40-80 cm., non épineux, très rameux, dressé, d'un vert blanchâtre; rameaux rapprochés, élancés, grêles, striés, les anciens sans feuilles; feuilles simples, elliptiques ou lancéolées, velues-soyeuses en dessous, sans stipules; fleurs solitaires ou géminées, en grappes allongées, grêles, lâches; calice velu, à lèvres inégales, plus longues que le tube; étendard pubescent, égalant la carène; ailes et carène toujours rapprochées de l'étendard; gousse de 15-18 mm. sur 5, à peine bosselée, velue-soyeuse, à 2-5 graines luisantes.

Coteaux secs des montagnes calcaires : Dauphiné; Provence; Ardèche, Lot, Pyrénées-Orientales. — Espagne et Portugal, Baléares, Italie, Sicile; Tunisie et Algérie. = Mai-août. — Les rameaux servent au chauffage et à la confection des balais.



Genista cinerea

773. — *G. tinctoria* L. Genêt des teinturiers. — Sous-arbrisseau de 30 cm. à 1 mètre, non épineux, dressé ou ascendant, vert, glabre ou pubescent; rameaux cylindriques, striés, tous feuillés; feuilles simples, lancéolées ou ovales; stipules en alêne; fleurs solitaires, en grappes terminales feuillées; calice glabre ou pubescent, à lèvres presque égales, égalant le tube; étendard glabre, égalant la carène; ailes et carène à la fin déjetées-pendantes; gousse de 25-30 mm. sur 4, linéaire, un peu arquée, non bosselée, glabre, rarement pubescente, à 5-12 graines mates. Plante polymorphe.

Bois et pâturages, dans presque toute la France; nul en Corse. — Europe, surtout centrale; Asie occidentale. = Mai-août. — La racine renferme une matière colorante jaune, et les boutons sont parfois confits comme les câpres.



Genista tinctoria