

**813.** — *Anthyllis cytisoides* L. — Sous-arbrisseau de 30-80 cm., à rameaux élancés, arrondis, blancs-tomenteux, feuillés, non spinescents; feuilles inférieures et florales simples, les autres trifoliolées, à folioles ovales ou lancéolées, planes, épaisses, cendrées, la terminale plus grande; fleurs jaunes, assez petites, 2-5 en fascicules axillaires formant des grappes longues, étroites et interrompues; calice à peine renflé, velu, à 5 dents presque égales, bien plus courtes que le tube; carène courbée, apiculée; gousse ovoïde, apiculée, glabre.

Coteaux arides de la région méditerranéenne: Var, Bouches-du-Rhône, Aude et Pyrénées-Orientales. — Espagne; Algérie. = Mai-juin.



*Anthyllis cytisoides*

**814.** — *A. Barba-Jovis* L. — Arbrisseau d'environ 1 mètre, à rameaux dressés, blancs-soyeux, très feuillés, non spinescents; feuilles imparipennées, à pétiole engainant, à 4-9 paires de folioles linéaires-oblongues, égales, soyeuses-argentées; fleurs d'un jaune clair, nombreuses, en têtes terminales et axillaires, pédonculées, entourées d'une bractée foliacée sessile et découpée; calice à peine renflé, velu-soyeux, à 5 dents presque égales, non plumeuses, bien plus courtes que le tube; étendard à limbe égalant l'onglet; carène droite, obtuse; gousse oblongue, acuminée, glabre, à 1 graine.

Rochers des bords de la Méditerranée: Alpes-Maritimes, Var, Hérault; Corse. — Italie, Sicile; Tunisie et Algérie. = Mai-juin.



*Anthyllis Barba-Jovis*

**815.** — *A. montana* L. — Plante de 10-30 cm., ligneuse et tortueuse à la base, ascendante, gazonnante, velue hérissée; feuilles imparipennées, à 8-15 paires de folioles oblongues, égales, vertes et velues; fleurs rouges, nombreuses, en têtes terminales, longuement pédonculées, entourées de 2 bractées foliacées sessiles et découpées; calice à peine renflé, velu, à dents plumeuses, un peu inégales, égalant le tube; étendard à limbe 2 fois plus long que l'onglet; carène un peu courbée, obtuse; gousse oblongue, acuminée, glabre, à 1 graine ovoïde, lisse.

Rochers et pelouses rocailleuses des montagnes calcaires de l'Est et du Midi: Jura et Bourgogne jusqu'au Cher; Alpes; Provence et Languedoc; Cévennes; Corbières et Pyrénées. — Europe méridionale; Algérie. = Mai-juillet.



*Anthyllis montana*

**816.** — *A. Vulneraria* L. *Vulnéraire*. — Plante vivace ou annuelle, à tiges couchées ou ascendantes, herbacées, pubescentes; feuilles imparipennées, les inférieures à 3-5 folioles très inégales, la terminale plus grande, les supérieures à 3-6 paires de folioles moins inégales; fleurs jaunes, rougeâtres ou blanches, en têtes denses, souvent géminées, longuement pédonculées, entourées de bractées foliacées; calice renflé en vessie, velu, à ouverture oblique, à 2 lèvres, la supérieure à 2 dents, l'inférieure à 3, bien plus courtes que le tube; étendard dépassant peu les ailes; carène à peine courbée, obtuse; gousse ovale, glabre, à 1-2 graines ovoïdes, lisses. Plante polymorphe.

Coteaux et pelouses sèches, dans presque toute la France et en Corse. — Europe; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Mai-août. — Vulnéraire et résolutive, la Vulnéraire entre dans la composition du thé suisse.



*Anthyllis Vulneraria*