



Medicago sativa



Medicago glomerata



Medicago falcata



Medicago Pourretii

821. — *Medicago sativa* L. *Lucerne commune*. — Plante vivace de 30-80 cm., glabrescente, à souche grosse, ligneuse, très profonde; tiges dressées ou ascendantes, très rameuses; folioles obovales ou oblongues, dentées au sommet; stipules longuement acuminées, dentées à la base; fleurs violacées ou bleuâtres, grandes, nombreuses, en grappes oblongues; pédoncules plus longs que la feuille; pédicelles plus courts que le tube du calice et que les bractées; gousse *glabre ou pubescente, dressée, non épineuse, courbée en spirale, ouverte au centre, à 2-3 tours de spire*, à plusieurs graines ovales.

Plante cultivée en grand surtout dans les terrains calcaires ou argileux, et subspontanée ça et là dans presque toute la France. Origine spontanée incertaine. — Juin-septembre. — La Lucerne est l'une de nos meilleures plantes fourragères.

822. — *M. glomerata* Bálb. — Voisin du précédent et du suivant. Plante vivace de 30-60 cm., à souche très longue; tiges ascendantes; folioles étroitement oblongues; stipules petites, lancéolées en alène, entières; fleurs jaunes, en grappes courtes, serrées, brièvement pédonculées; pédicelles plus longs que le tube du calice; gousse un peu plus petite, *très velue-glanduleuse, courbée en spirale, décrivant 2-3 tours de spire*, à plusieurs graines ovales.

Bords des chemins et lisières des bois, dans le Var et les Alpes-Maritimes. — Italie, dans la Ligurie; Espagne. — Mai-juin.

823. — *M. falcata* L. — Plante vivace de 30-80 cm., pubescente, à souche forte, ligneuse, très longue; tiges couchées ou ascendantes, très rameuses; folioles étroitement oblongues en coin, denticulées au sommet; stipules lancéolées en alène, entières ou denticulées à la base; fleurs jaunes, assez grandes, nombreuses, en grappes ovales; pédoncules plus longs que la feuille; pédicelles plus longs que le tube du calice et les bractées; gousse *pubescente, dressée, non épineuse, courbée en fauille*, à 2-5 graines ovales.

Varie à fleurs versicolores, d'abord jaunâtres, puis violacées ou blanchâtres, gousse courbée en anneau (*M. MEDIA* Pers.; *M. CYCLOCARPA* Hy.).

Chemins, talus, coteaux stériles, dans une grande partie de la France, surtout dans le Midi. — Presque toute l'Europe; Asie occidentale et centrale jusqu'à l'Inde. — Mai-septembre.

824. — *M. Pourretii* Noulet (*TRIGONELLA HYBRIDA* Pourr.). — Plante vivace de 10-40 cm., glabre, à souche dure, ligneuse; tiges couchées ou ascendantes, peu rameuses; folioles orbiculaires ou largement ovales, denticulées; stipules ovales-aiguës, dentées; fleurs jaunes, petites, 2-3 sur des pédoncules plus courts que la feuille ou l'égalant; ailes égalant la carène; gousse *glabre, pendante, non épineuse, courbée en faux, aplatie, veinée en réseau, déhiscente, à 2-3 graines oblongues en rein*.

Bois et pelouses calcaires des Corbières et des Pyrénées: Aude, Pyrénées-Orientales, Ariège, Haute-Garonne; Hérault. Espèce exclusivement française. — Juin-juillet.