

991. — *Vicia angustifolia* Reich. — Plante annuelle de 40-80 cm., pubescente; feuilles à 4-7 paires de folioles, les supérieures étroites, aiguës, obtuses ou tronquées; vrilles rameuses; stipules dentées, souvent tachées; fleurs d'un rouge vif ou à étendard violacé avec ailes rouges, assez petites, n'atteignant pas 2 cm., solitaires ou gémées, subsessiles; calice à dents égales, égalant le tube; gousse de 30-40 mm. sur 4-7, étroitement cylindracée, non bosselée, ni stipitée, dressée ou étalée, glabre et noire à la maturité; graines petites, globuleuses, non séparées par du tissu cellulaire. Plante polymorphe.

Lieux cultivés et incultes, dans toute la France et en Corse. — Europe; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Mai, juillet.



Vicia angustifolia

992. — *V. sativa* L. Vesce cultivée. — Plante annuelle de 30-80 cm., pubescente, grimpante; feuilles à 5-7 paires de folioles larges, tronquées ou échancrées; vrilles rameuses; stipules dentées, tachées; fleurs grandes (2-3 cm.), à étendard violacé avec ailes d'un pourpre brun, gémées, rarement solitaires, subsessiles; calice à dents égales, égalant le tube; gousse de 40-60 mm. sur 6-10, large, comprimée, bosselée, non stipitée, dressée ou étalée, pubérulente, d'un fauve pâle à la maturité; graines grosses, subglobuleuses, séparées par du tissu cellulaire. Plante polymorphe.

Lieux cultivés et incultes, dans toute la France et en Corse. — Europe; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Mai-juillet. — Cultivé en grand pour les bestiaux.



Vicia sativa

993. — *V. bithynica* L. — Plante annuelle de 20-60 cm., pubescente, grimpante, ayant le port d'un Lathyrus; feuilles à 1-3 paires de folioles ovales, oblongues ou lancéolées; vrilles rameuses; stipules grandes, incisées; fleurs à étendard violacé et à ailes blanches, assez grandes, 1-3 sur un pédoncule plus court ou plus long que la feuille; calice à dents presque égales, plus longues que le tube; gousse de 23-33 mm. sur 7-10, oblongue-rhomboidale, comprimée, non stipitée, velue, jaunâtre; graines globuleuses.

Lieux cultivés et incultes du Midi et de l'Ouest; Provence, Languedoc, Roussillon; de l'Aveyron jusqu'au Morbihan; Corse. — Europe méridionale; Asie Mineure; Algérie. = Mai-juin.



Vicia bithynica

994. — *V. Faba* L. (FABA VULGARIS Moench). Fève. — Plante annuelle de 30-80 cm., glabrescente, dressée, robuste; feuilles à 1-3 paires de folioles très grandes, ovales, entières, succulentes; vrille courte et simple; stipules larges, dentées, tachées; fleurs blanches avec ailes noires, grandes, 2-3 en petites grappes très brièvement pédonculées, bien plus courtes que la feuille; calice à dents inégales, les 2 supérieures courtes et conniventes; gousses très grandes, longues de 10 à 20 cm., renflées, charnues, non stipitées, dressées, pubérulentes, ridées et noires à la maturité; graines longues de 2-3 cm., ovales-comprimées, à hile linéaire-oblong.

Originaire de l'Asie, cultivé en grand pour les usages domestiques dans les champs et les jardins, et parfois subspontané dans leur voisinage. = Mai-juillet.



Vicia Faba