

1046. — *Lathyrus vernus* Bernh. (*Orobis vernus* L.). — Plante vivace de 20-40 cm., glabre, à souche épaisse, noueuse; tiges anguleuses, non grimpantes; feuilles à 2-4 paires de folioles ovales ou lancéolées, longuement acuminées, très aiguës, molles, vertes et luisantes; pétiole non ailé, bien plus long que les stipules ovales-lancéolées, terminé en simple mucron; fleurs d'un rose violet puis bleues, assez grandes (14-18 mm.), 3-8 en grappes lâches dépassant la feuille; gousses de 4-6 cm. sur 5-6 mm., linéaires, veinées en réseau, glabres, brunes à la maturité; graines jaunâtres.

Bois montagneux, surtout calcaires: tout l'Est, de la Lorraine à la Provence; Cévennes; Corbières; Pyrénées. — Presque toute l'Europe; Asie occidentale. = Avril-juin.

1047. — *L. tuberosus* L. *Gland de terre*, *Anottes*. — Plante vivace de 30-80 cm., glabre, à souche profonde munie de tubercules ovoïdes; tiges anguleuses, faibles, grimpantes; feuilles à 1 paire de folioles elliptiques ou oblongues, mucronulées; pétioles non ailés, égalant les stipules linéaires-lancéolées; vrilles rameuses; fleurs d'un rose vif, assez grandes (14-16 mm.), odorantes, 3-5 en grappes lâches bien plus longues que la feuille; style arqué-ascendant, tordu sur son axe; gousses de 25-35 mm. sur 4-6, linéaires-cylindriques, veinées, glabres, fauves à la maturité.

Moissons et coteaux, surtout calcaires, dans presque toute la France. — Europe; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Juin-septembre. — Les tubercules sont comestibles et recherchés des enfants.

1048. — *L. maritimus* Big. — Plante vivace de 10-40 cm., glabre, à souche longuement rampante; tiges anguleuses; feuilles à 2-4 paires de folioles obovales ou elliptiques, mucronulées; pétioles non ailés, plans en dessus; vrilles simples ou rameuses; stipules larges, ovales-lancéolées; fleurs à étendard purpurin avec ailes et carène bleuâtres, assez grandes (15-20 mm.), 3-8 en grappes courtes, assez serrées, sur des pédoncules plus courts que la feuille; style droit, non tordu; gousses de 4-5 cm. sur 8 mm., largement linéaires, comprimées, veinées en réseau, pubescentes, à la fin glabres et d'un fauve rougeâtre.

Graviers et galets du littoral de la Manche: Somme, Seine-Inférieure et Manche, où il est très rare. — Europe, Asie et Amérique septentrionales; Chili. = Juin-août.

1049. — *L. palustris* L. — Plante vivace de 30-80 cm., glabre, à souche grêle, non rampante; tiges étroitement ailées, grêles, grimpantes; feuilles à 2-4 paires de folioles oblongues ou lancéolées, mucronulées; pétioles à peine ailés, canaliculés en dessus; vrilles rameuses; stipules petites, linéaires-lancéolées; fleurs purpurines puis bleuâtres, assez grandes (13-16 mm.), 3-8 en grappes lâches sur des pédoncules égalant ou dépassant la feuille; style droit, non tordu; gousses de 3-4 cm. sur 7-8 mm., largement linéaires, comprimées, veinées en réseau, glabres, noirâtres à la maturité.

Prés marécageux, dans l'Ouest, le Centre et le Nord; nul dans le Midi, le Plateau central et presque tout l'Est. — Europe centrale et boréale; Asie et Amérique septentrionales. = Juin-août.



Lathyrus vernus



Lathyrus tuberosus



Lathyrus maritimus



Lathyrus palustris