


- > Rameaux flexueux, pleins, durs, non compressibles, ni jonciformes; folioles obovales ou oblongues en coin; gousses droites, à articles offrant 2 angles. Fleurs 2-4 sur des pédoncules souvent plus courts que la feuille; pédicelles plus courts que le calice; pétales à onglets 2-3 fois plus longs que le calice; gousses très longues, à articles peu marqués. **C. Emerus** 1063
- Fleurs 5-12 sur des pédoncules 1-2 fois plus longs que la feuille; pédicelles 1 fois plus longs que le calice; pétales à onglets dépassant à peine le calice; gousses à articles bien marqués et se séparant facilement. Feuilles à 2-3 paires de folioles obovales, la terminale un peu plus grande; stipules très petites, linéaires-lancéolées; gousses courtes (12-18 mm.), à 2-3 articles oblongs. **C. glauca** 1064
- Feuilles à 3-6 paires de folioles oblongues en coin, échancrées; stipules grandes, orbiculaires en rein, mucronées, plus larges que les folioles; gousses allongées, à 4-7 articles en fuseau. . . **C. valentina** 1065

1057. — *Coronilla varia* L. — Plante vivace de 30-60 cm., glabre, verte, à racine rampante; tiges herbacées, creuses, étalées-diffuses; *feuilles imparipennées, à 7-12 paires de folioles oblongues, les 2 inférieures rapprochées de la tige*; stipules linéaires, libres; fleurs panachées de blanc, de rose et de violet, assez grandes (1 cm.), 10-15 en ombelles sur des pédoncules dépassant les feuilles; pédicelles 2 fois plus longs que le calice; *gousses dressées à la maturité, un peu flexueuses, à 3-6 articles, à 4 angles obtus, terminées en long bec.*


Bois et coteaux pierreux, surtout calcaires, dans presque toute la France. — Europe centrale et méridionale; Asie occidentale jusqu'à la Perse. = Mai-août.



Coronilla varia

1058. — *C. scorpioides* Koch. — Plante annuelle de 10-40 cm., glabre et glauque, à racine pivotante; tiges herbacées; *feuilles inférieures simples, spatulées, les autres trifoliolées, à folioles très inégales, la terminale bien plus grande et ovale, les latérales petites, arrondies en rein, sessiles et rapprochées de la tige*; stipules petites, soudées; fleurs jaunes, petites, 2-4 sur des pédoncules égalant ou dépassant peu la feuille; pédicelles de moitié plus courts que le calice; *gousses étalées horizontalement, longues de 30-40 mm., arquées, noueuses, striées, à 3-8 articles et à 6 angles obtus.*

Moissons et lieux cultivés, dans le Midi, l'Ouest et le Centre, jusque dans le Cher. — Europe méridionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Avril-juin.



Coronilla scorpioides

1059. — *C. coronata* L. (*C. montana* Jacq.). — Plante vivace de 30-60 cm., glabre et glauque, à souche ligneuse; tiges herbacées dès la base, dressées, creuses; *feuilles imparipennées, à 3-6 paires de folioles grandes, obovales, obtuses, mucronulées, la paire inférieure très rapprochée de la tige*; stipules inférieures soudées en une seule assez grande, caduque; fleurs jaunes, assez grandes, fétides, 15-20 en ombelles sur des pédoncules 2 fois plus longs que la feuille; pédicelles 2 fois plus longs que le calice; *gousses pendantes, longues de 25-30 mm., droites, à 2-5 articles oblongs, à 4 angles peu marqués, obtus, non ailés.*

Bois et coteaux calcaires des montagnes de l'Est: Yonne, Côte-d'Or, Doubs, Ain, Isère, Savoie, Haute-Savoie. — Europe centrale et méridionale; Asie occidentale. = Mai-juillet.



Coronilla coronata