





Coronilla minima



Coronilla vaginalis



Coronilla juncea



Coronilla Emerus

1060. — *Coronilla minima* L. — Plante vivace de 10-30 cm., à souche ligneuse; tiges sous-ligneuses à la base, pleines, couchées-diffuses; *feuilles imparipennées*, à 3-4 paires de folioles petites, obovales en coin, épaisses, la paire inférieure très rapprochée de la tige; stipules toutes soudées en une seule très petite (1 mm.) et persistante; fleurs jaunes, petites (3-7 mm.), 5-10 en ombelles sur des pédoncules 2-3 fois plus longs que la feuille; pédicelles à peine plus longs que le tube du calice, à lèvre supérieure entière et tronquée; gousses pendantes, de 20-25 mm., droites, à 2-5 articles oblongs, à 4 angles obtus, non ailés.

Varie à tiges ligneuses, en buisson de 20-30 cm. (var. *australis* G. G.; *C. coronata* DC. non L.).

Pelouses et coteaux calcaires, dans presque toute la France, surtout dans le Midi. — Espagne, Suisse, Italie; Afrique septentrionale. = Mai-juillet.

1061. — *C. vaginalis* Lamk. — Plante vivace de 10-25 cm., à souche ligneuse; tiges sous-ligneuses à la base, pleines; *feuilles de 3-6 paires de folioles petites, obovales en coin, la paire inférieure écartée de la tige*; stipules grandes (6-8 mm.) soudées en une seule longuement engainante, bidentée, caduque; fleurs jaunes, petites, 4-10 en ombelles sur des pédoncules 1-2 fois plus longs que la feuille; pédicelles égalant le calice à lèvre supérieure bidentée; gousses pendantes, de 20-30 mm., droites, à 3-6 articles ovales, à 6 angles dont 4 un peu ailés.

Pelouses et rocallles calcaires des hautes montagnes de l'Est: Jura et côtes du Doubs; Isère, Savoie, Haute-Savoie, Hautes-Alpes et Basses-Alpes. — Europe centrale et méridionale. = Juin-août.

1062. — *C. juncea* L. — Sous-arbrisseau de 30 cm. à 1 mètre; rameaux, droits, effilés, compressibles, jonciformes, striés; *feuilles imparipennées, à 2-3 paires de folioles linéaires-oblongues, la paire inférieure écartée de la tige*, les florales souvent à 3 folioles; stipules petites, 5-8 en ombelles sur des pédoncules plus longs que la feuille; pédicelles 1 fois plus longs que le calice; onglets des pétales égalant le calice; gousses pendantes, de 15-25 mm., un peu arquées, à 2-7 articles quadrangulaires.

Coteaux de la Provence: Bouches-du-Rhône, Var, Basses-Alpes. — Espagne et Portugal, Baléares, Italie, Dalmatie; Afrique septentrionale. = Avril-juin.

1063. — *C. Emerus* L. Séné bâtarde. — Arbrisseau de 30 cm. à 2 mètres; rameaux flexueux-noueux, durs, pleins, anguleux; *feuilles imparipennées, à 2-4 paires de folioles obovales, la terminale un peu plus grande*; stipules petites, lancéolées, libres, marcescentes; fleurs jaunes, grandes (15-20 mm.), 2-4 sur des pédoncules souvent plus courts que la feuille; pédicelles plus courts que le calice; onglets 2-3 fois plus longs que le calice; gousses pendantes, longues de 5-10 cm., droites, à 7-10 articles peu marqués, à 2 angles obtus.

Bois et coteaux, surtout calcaires, dans l'Est, le Midi et le Sud-Ouest; Corse. — Europe méridionale et centrale jusqu'à la Norvège. = Avril-juin. — Souvent cultivé.