



Sempervivum tectorum

**1391. — *Sempervivum tectorum* L. Herbe du tonnerre.** — Plante vivace de 20-30 cm., robuste, assez longuement et mollement velue; *rosettes grandes* (5-8 cm.), à *feuilles obovales-oblongues*, *peu rétrécies à la base*, à *faces glabres, non glanduleuses*; feuilles caulinaires oblongues, submucronées; fleurs d'un rose pâle, grandes (20-30 mm.), pédicellées ou subsessiles, en panicule thyrsoidé ou corymbiforme; *pétales étalés, lancéolés-linéaires, pubescents, 2 fois plus longs que le calice*; carpelles oblongs-acuminés.

Murs, toits, rochers, surtout des montagnes, dans presque toute la France. — Europe, surtout centrale; Caucase; Perse. — Juin-août. — Plante acré et astrigente, plantée par les anciens sur les murs et les toits soi-disant pour les préserver de la foudre.

**Genre 248. — *UMBILICUS* DC.**

(Du latin *umbilicus*, ombilic : allusion à la forme des feuilles de l'espèce principale.)

Calice à 5 lobes ovales-aigus; corolle monopétale, à 5 lobes ovales-mucronulés; 10 étamines, insérées sur la corolle, sur 2 rangs; 5 écailles nectarifères, linéaires, tronquées ou bifides; 5 carpelles, plus courts que la corolle, acuminés par le style en alène, à 1 seule loge et à graines nombreuses.

Fleurs d'un blanc jaunâtre ou roses, en épis ou en têtes terminales; feuilles alternes, épaisses; plantes charnues, glabres, à tiges ordinairement simples.

Environ 75 espèces habitant l'Europe, l'Asie, l'Afrique, le Mexique.

**TABLEAU DES ESPÈCES.**

Feuilles inférieures orbiculaires, peltées-ombiliquées, crénées; fleurs d'un blanc jaunâtre, pédicellées, penchées, en grappe allongée; plante vivace de 10-40 cm.

***U. pendulinus* 1392**

Feuilles toutes oblongues, obtuses, nombreuses et imbriquées sur les tiges; fleurs roses, subsessiles, dressées, 2-4 en têtes courtes et serrées; plante annuelle de 3-6 cm.

***U. sedoides* 1393**



Umbilicus pendulinus

**1392. — *Umbilicus pendulinus* DC. (COTYLEDON UMBILICUS L.). Gobelets, Nombril de Vénus.** — Plante vivace de 10-40 cm., glabre, verte, à souche tubéreuse; tiges peu feuillées; *feuilles radicales orbiculaires, peltées-ombiliquées*, de 3-6 cm. de diam., *crénées, longuement pétiolées*, succulentes, cassantes; les caulinaires peu nombreuses, en coin; *fleurs d'un blanc jaunâtre, pédicellées, pendantes, nombreuses, formant une longue grappe* bractéolée occupant presque toute la tige; *corolle tubuleuse, 4 fois plus longue que le calice*.

Vieux murs et rochers ombragés des terrains siliceux, dans tout le Midi, le Centre, l'Ouest; remonte jusqu'à la Côte-d'Or, le Cher, la Seine-Inférieure; Corse. — Europe occidentale et méridionale; Asie Mineure; Afrique septentrionale. — Mai-juillet. — Plante rafraîchissante.

**1393. — *U. sedoides* DC. (COTYLEDON SEDOIDES DC.).**

— Plante annuelle de 3-6 cm., glabre, rougeâtre, croissant en petites touffes, à racine grêle; tiges courtes, feuillées; *feuilles petites, oblongues, obtuses, convexes, nombreuses, imbriquées et presque dressées sur les tiges*; fleurs roses, subsessiles, dressées, 2-4 rapprochées en petites têtes terminales; corolle en cloche, 2 fois plus longue que le calice; carpelles inclus.

Éboulis, graviers, crêtes siliceuses des Pyrénées centrales et orientales : Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Pyrénées-Orientales, Aude. — Espagne et Portugal. — Juin-août.



Umbilicus sedoides