

Fleurs rougeâtres; bractées velues, aiguës; calice tomenteux, en cloche; baies noires, à saveur aromatique. . . . . **R. nigrum** 1398

Fleurs verdâtres; bractées glabres, obtuses; calice glabre à limbe plan; baies rouges ou blanchâtres, à saveur acide. . . . . **R. rubrum** 1399

Grappes florifères dressées; bractées égalant presque ou dépassant les pédicelles; baies rouges.

Fleurs rougeâtres, hermaphrodites; bractées velues, obtuses; calice à limbe dressé; baies en grappes pendantes, à saveur acerbe . . . . . **R. petraeum** 1400

Fleurs verdâtres, dioïques; bractées glabres ou ciliées, aiguës; calice à limbe plan; baies en petites grappes dressées, à saveur fade. . . . . **R. alpinum** 1401

**1397.** — **Ribes Uva-crispa** L. *Groseillier à maquereau*. — Sous-arbrisseau de 80 cm. à 1 m. 50, très rameux en buisson, à tiges et rameaux munis d'épines tripartites; feuilles petites, fasciculées, palmatilobées-suborbiculaires, à 3-5 lobes obtus, crénelés, velues ou pubescentes; fleurs verdâtres ou un peu rougeâtres, solitaires ou géminées, courtement pédicellées; calice pubescent, non glanduleux, en cloche, à sépales oblongs, réfléchis; pétales poilus, obovales, dressés, trois fois plus courts que les sépales; baies assez grosses, verdâtres, jaunâtres ou rougeâtres, à la fin glabres.

Varie à baies hispides-glanduleuses (**R. GROSSULARIA** L.).

Haies, bois, buissons, dans une grande partie de la France. — Europe; Caucase; Algérie. = Fl. mars-mai, fr. juin-août. — Fréquemment cultivé.



**Ribes Uva-crispa**

**1398.** — **R. nigrum** L. *Cassis*. — Sous-arbrisseau de 1 m. à 1 m. 50, non épineux, hermaphrodite, parsemé sur les feuilles en dessous, sur les bourgeons et sur les fruits de glandes jaunes odorantes; feuilles palmatilobées, à 3-5 lobes triangulaires, dentés, pubescentes en dessous; fleurs rougeâtres, en grappes axillaires toujours pendantes; bractées velues, lancéolées-aiguës, plus courtes que les pédicelles; calice en cloche, tomenteux en dehors, ponctué-glanduleux, à sépales oblongs, obtus, réfléchis en dehors; pétales obovales, deux fois plus courts que les sépales; baies noires, ponctuées, à saveur et odeur aromatiques.

Bois du Nord-Est: Ardennes, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Alsace-Lorraine. — Très cultivé, et parfois spontané. — Europe centrale et boréale; Arménie, Sibérie, Daouric. = Fl. avril-mai, fr. juillet-août.



**Ribes nigrum**

**1399.** — **R. rubrum** L. *Groseillier à grappes*. — Sous-arbrisseau de 1 m. à 1 m. 50, non épineux, hermaphrodite; feuilles grandes, palmatilobées, à 3-5 lobes profondément dentés, pubescentes en dessous; fleurs d'un vert jaunâtre, en grappes axillaires toujours pendantes; bractées glabres, ovales-obtus, bien plus courtes que les pédicelles; calice en coupe, glabre, à sépales obovales, obtus, plans; pétales en coin, beaucoup plus courts que les sépales; baies rouges, rarement blanchâtres, glabres, à saveur acide.

Bois du Nord-Est: Ardennes, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Alsace-Lorraine, chaîne du Jura. — Très fréquemment cultivé partout, et spontané çà et là aux bords des rivières. — Europe; Asie; Amérique du Nord. = Fl. avril-mai, fr. juillet-août.



**Ribes rubrum**