

Calice à dents ovales-obtuses, brusquement et brièvement aristées; feuilles palmatiséquées, à 7-9 segments profonds, lancéolés, profondément dentés; plante grêle de 10-33 cm.

A. minor 1437



Astrantia major

✗ **1456. — Astrantia major L. Grande Radiaire.** —

Plante vivace de 20-60 cm., glabre, à tige simple ou à rameaux opposés; feuilles luisantes, d'un vert plus foncé en dessus, les radicales longuement pétiolées, *palmatipartites*, en cœur à la base, à 3-7 segments ovales ou oblongs en coin, incisés-dentés, à dents aristées; les caulinaires peu nombreuses, subsessiles; ombelles terminales et latérales; involucre à folioles nombreuses, étalées, veinées en réseau, lancéolées-oblongues, aristées, égalant ou dépassant les fleurs; calice à dents lancéolées, acuminées, aristées; fruit oblong atténue à la base, à écailles blanches et obtuses.

Prairies et pâturages des montagnes: Jura; Alpes; Forez, mont Mézen, Auvergne; Corbières et Pyrénées. — Europe, surtout centrale; Caucase. = Juin-août.

✗ **1457. — A. minor L. Petite Radiaire.** — Plante

vivace de 10-33 cm., à tige grêle, dressée; feuilles d'un vert pâle, les radicales longues et pétiolées, *palmatiséquées*, à 7-9 segments petits, lancéolés en coin, profondément dentés en scie, à dents aristées; les caulinaires 1-2 par tige; ombelles petites, à rayons grêles et longs; involucre à folioles moins nombreuses, étroites, lancéolées, rarement trifides, obscurément veinées en réseau; calice à dents ovales, obtuses, brusquement et brièvement aristées; fruit ovale, couvert d'écailles subaiguës ou à peine obtuses.

Pâturages et rochers humides des hautes montagnes: Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Auvergne; chaîne des Pyrénées. — Espagne et Italie septentrionales; Suisse; Tyrol. = Juillet-août.

Genre 256. — SANICULA L. — Sanicle.

(Du latin *sanare*, guérir: allusion aux innombrables propriétés médicinales attribuées jadis à cette plante.)

Environ 12 espèces habitant l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique.

✗ **1458. — Sanicula europaea L. Herbe de Saint-Laurent.** — Plante vivace de 20-30 cm., glabre, à tige

simple, dressée, grêle, presque nue; feuilles luisantes, les radicales longuement pétiolées, *palmatipartites en rein*, à 3-5 segments oblongs en coin, bi-trifides et incisés-dentés; les caulinaires 1-2, subsessiles; fleurs blanches ou rosées, sessiles, en têtes globuleuses disposées en ombelle irrégulière, à 3-5 rayons très inégaux; involucre à 2-4 folioles incisées; involucelle court; calice à 5 dents foliacées, dressées, lancéolées-aristées, accrescentes; pétales connivents, obovales-émarginés, à pointe longue et infléchie en dedans; fruit subglobuleux, hérissé d'aiguillons crochus, à section transversale suborbiculaire; méricarpes presque soudés, caducs, sans côtes apparentes; carpophore adhérent aux carpelles, entier; graine à face commissurale plane.

Bois, lieux couverts, dans presque toute la France et en Corse. — Europe; Asie occidentale jusqu'à l'Inde; Afrique septentrionale. = Mai-juillet. — Plante vulnéraire, astringente et détersive.



Sanicula europaea